



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 11 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể bằng tuần này, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 398mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 15.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 98.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 47.4 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 14-15/11, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 15/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 16/11, phía bắc có mưa, mưa vừa và dông; phía nam có mưa rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17-21/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.0	19.4	22.2	446.0
Trong tuần	25.3	19.3	22.3	48.0
Tuần tới	27.5	17.0	22.3	146.1

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa hè thu, lúa mùa sớm và chính vụ đã thu hoạch xong; Lúa mùa muộn đang giai đoạn chín - thu hoạch. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48.0mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần giảm mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho quá trình thu hoạch diện tích lúa muộn. Đối với phần diện tích trồng lúa hè thu và lúa mùa sớm đã thu hoạch xong, người dân cần cày bừa phơi đất, xử lý đất bằng vôi bột hoặc các biện pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng đất tốt, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tối cao tuần kế tiếp tăng trong khi nhiệt độ tối thấp giảm, chênh lệch nhiệt độ tương đối lớn (10 độ C) đồng thời lượng mưa dự báo có xu thế tăng, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 1 tháng 11 dao động từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí

trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp cho mía phát triển. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần này, dao động từ 17.0- 27.5°C, lượng mưa tăng khoảng 100mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh cần mía gốc, bướm trắng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48.0mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp thay đổi không đáng kể trong khi lượng mưa tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: sâu đục ngọn, bọ hung nâu, bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông.

Cây sắn: diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, một số diện tích giai đoạn cây con - phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nên nhiệt tuần này dao động từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48.0mm, tương đối phù hợp cho sắn phát triển bình thường. Cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt độ trung bình tuần sau thay đổi không đáng kể và lượng mưa tăng khoảng 100mm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Ngô Đông: trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48.0mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa tăng và nhiệt độ tăng không đáng kể so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là khoai sọ, bắp cải, đậu tương... Nhiệt độ trung bình tuần này là 22.3 độ C, tăng không đáng kể so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ thay đổi không đáng kể, lượng mưa tăng (100mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 19.3 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 48.0mm; chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối rễ, bọ trĩ. Nhiệt độ tuần kế tiếp thay đổi không đáng kể và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 146.1mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ thay đổi không đáng kể đồng thời lượng mưa tăng, các cây trồng cần được chú ý biện pháp chăm sóc thích hợp với từng giai đoạn phát triển và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng