



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 10 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 17.3 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 23.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 582.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 12.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 02-08/11 có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 08-11/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, từ ngày 11/11 mưa có xu hướng giảm xuống diện vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.2	18.6	20.4	605.8
Trong tuần	23.7	17.3	20.5	23.5
Tuần tới	25.8	17.6	21.7	35.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 03 tháng 10 năm 2020 được khái quát như sau:

Phần lớn diện tích lúa khu vực Đông Bắc đã thu hoạch xong. Do đó, thời gian này người dân tập trung dọn dẹp đồng ruộng, tiêu trừ mầm bệnh, chuẩn bị đất nền cho vụ sau. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 17.3 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 23.5mm. Thời kỳ cải tạo đất nền là thời kỳ cổ đại phát triển tương đối nhanh, do đó,

người dân cần có biện pháp cải tạo đất nền hiệu quả, đảm bảo tiêu diệt được mầm mống dịch hại và một phần cổ đại có trên đồng ruộng đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ lúa tiếp theo. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, trong tuần tới cần tiếp tục lưu ý cổ đại có khả năng phát triển.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động 17.3 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 23.5mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh sương mai, nhện lông nhung.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của

quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 17.3 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 23.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 21.7 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo tăng nhẹ (khoảng 10mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh chầy gôm, rệp sáp bông.

Cây ngô: Ngô đông đang giai đoạn 7 lá - xoáy nõn, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25 - 28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 17.3 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 23.5mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với tổng lượng mưa khoảng 10mm, cần chú ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên và lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối gốc, rầy nâu.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 17.3 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 23.5mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: nhện đỏ, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 28.4°C và lượng mưa giảm, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu nhất là các loại rau chịu nóng kém; đồng thời lưu ý một số loại sâu: bệnh xoắn trùn ngọng, sâu tơ hại rau.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.6 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 35.6mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, các cây trồng cần được chú ý biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn và sử dụng phương pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng