



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 1 tháng 11 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 18.7 - 24.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.7°C, tổng lượng mưa là 201.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.9^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.9^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.8^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 100mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 62.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 156mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 11/11, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 12-20/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 14-15/11 phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.8	19.4	22.6	101.9
Trong tuần	24.8	18.7	21.7	201.9
Tuần tới	29.4	17.3	23.4	45.9

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 1 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: vụ Hè Thu trà muộn trong giai đoạn chín, thu hoạch; vụ Mùa trà chính vụ đang trong giai đoạn làm đòng-ngậm sữa, trà muộn giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng; lúa Thu Đông (Đắc Lắc) giai đoạn mạ-đẻ nhánh. Đối với giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là 25 – 30°C. Trong giai đoạn đẻ nhánh, đòng – trổ nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Thời kỳ trổ bông, làm hạt là thời kỳ cây lúa mẫn cảm nhất với điều kiện ngoại cảnh, nhất là nhiệt độ. Thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28 – 30°C. Với nhiệt độ dự báo dao từ 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm, qua đó cho thấy nhiệt độ trong tuần này thấp hơn ngưỡng cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Lưu ý: bệnh khô vằn, bệnh đen lép thối hạt,...phát sinh gây hại nhẹ trên lúa vụ Mùa giai đoạn đòng trổ - chắc xanh; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm,...tiếp tục gây gây hại trên lúa giai đoạn đòng - trổ; bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ; Chuột tiếp tục gây hại trên các trà lúa, co cụm vùng gò đồi nơi có mưa lũ; Ốc bươu vàng: di chuyển và lây lan diện rộng theo mưa lũ; Ngoài ra rầy các loại, bệnh đốm nâu nghệt rễ... gây hại nhẹ, rải rác.

Ngô: ngô vụ 2 đang trong giai đoạn cây con, PTTL. Giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp trong khoảng 25 - 28°C, lượng nước cần từ 28 - 35 m<sup>3</sup>, nước/ngày/ha. Đối

với giai đoạn phun râu nhiệt độ thích hợp từ 25 - 28°C, 65 – 70 m<sup>3</sup>, nước/ngày/ha. Với điều kiện nhiệt độ dự báo cho tuần tới dao động từ 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm, cho thấy nhiệt độ thấp hơn so với ngưỡng sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần sâu keo mùa thu gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT. Ngoài ra, sâu ăn lá, sâu xanh, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt, bệnh lở cổ rễ, thối rễ, sâu đục thân, sâu đục quả gây hại rải rác. Theo dõi và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch; vụ Hè Thu 2020 giai đoạn phát triển thân lá, nuôi củ, thu hoạch; vụ Mùa và Thu Đông đang trong giai đoạn phát triển thân lá. Thời kỳ phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Đối với giai đoạn phát triển thân củ sắn yêu cầu nhiệt độ thích hợp từ 25 - 35°C. Với nhiệt độ dự báo dao động 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm không thực sự thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Lưu ý: thoát nước cho những vườn cây ngập, trũng. Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT tập trung chủ yếu tại Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng. Ngoài ra, bọ phấn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ gây hại cục bộ, bệnh chổi rồng, bệnh đốm lá, cháy lá vi khuẩn...gây hại rải rác trên cây sắn giai đoạn PTTL.

Rau màu: đang trong các giai đoạn sinh trưởng. Chú ý các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, rầy mềm và bệnh thối nhũn, thán thư, đốm lá... Quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp.

Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non. Nhiệt độ thích hợp cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Với nhiệt độ dự báo trong tuần dao động từ 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm, là điều kiện thuận lợi cho hồ tiêu phát triển. Lưu ý: tuyến trùng có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; bệnh chết nhanh gia tăng so với kỳ trước và CKNT phân bố chủ yếu tại Đắk Lắk, Lâm Đồng; bệnh chết chậm có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và CKNT tập trung chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Điều: đang trong giai đoạn chăm sóc, ra đọt non. Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng và phát triển tốt là từ 24 đến 28°C, lượng nước cần từ 28 – 50mm/tuần. Với nhiệt độ dự báo dao động từ 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm, điều kiện không thực sự thích hợp cho cây điều trong giai đoạn này khi nhiệt độ tối thấp dưới ngưỡng sinh trưởng và phát triển của cây. Bệnh thán thư có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, đục cành, bọ xít muỗi, bệnh khô cành gây hại cục bộ các vườn chăm sóc kém. Thực hiện tốt các

biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, làm sạch cỏ dại trên vườn và xung quanh bờ, tạo cho vườn điều thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh.

Sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Lưu ý bệnh nứt thân xì mủ, Bệnh héo chết nhanh do Phytophthora trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu thanh long, sâu tiện vỏ, dòi đục lá, sâu đục thân, mọt đục thân cành, nhện đỏ, bệnh sẹo, thán thư, bệnh vàng lá gân xanh gây hại rải rác.

Cà Phê: đang trong giai đoạn nuôi quả, chín bói, thu hoạch. Đối với cà phê chè nhiệt độ thích hợp từ 18– 25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, song giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Với nhiệt độ dự báo cho tuần tới dao động từ 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm, trong ngưỡng thuận lợi cho cà phê sinh trưởng và phát triển. Đề phòng bọ xít muỗi phát sinh gây hại gia tăng. Chú ý phòng trừ rệp sáp, tuyến trùng, vàng lá, thối rễ, bệnh rỉ sắt và bọ xít muỗi trên cà phê chè. Hạn chế và không sử dụng hoạt chất Glyphosate phòng trừ cỏ dại từ nay đến hết vụ thu hoạch để quản lý tốt dư lượng thuốc BVTV khi thu hoạch. Đề phòng các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như: Rệp sáp hại cành, rệp vảy nâu, vảy xanh phát sinh gây hại tăng dần và có khả năng gây hại cục bộ trên những diện tích cà phê già cỗi, chăm sóc kém, mọt đục cành, sâu đục thân phát sinh gây hại cục bộ rải rác. Chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 3 cho cây.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.3 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 45.9mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ tăng, chú ý thoát nước cho những vườn cây ngập và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**