

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 5 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 22 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 64.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoản 3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoản 4.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoản 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa tuần 2 tháng 5 có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 45.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 21.4\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể giảm đáng kể so với tuần này.

Bảng 1: Tổng hợp đặc trưng khí tượng khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.8	21.8	25.3	19.6
Trong tuần	29.4	22.0	25.7	64.9
Tuần tới	33.9	23.5	28.7	29.9

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 5 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây Lúa: Lúa trà cực sớm đang ở giai đoạn chắc xanh, lúa trà chính vụ trong giai đoạn ngâm sữa, lúa trà muộn giai đoạn đòng già và trổ; điều kiện khí hậu thuận lợi cho giai đoạn này nhiệt độ thích hợp nhất là 25-32°C, nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa, với số liệu thống kê tuần này và tuần tới có thể thấy tuần nhiệt độ biến động trong khoảng 22 - 34°C, lượng mưa dao động 29.9- 64.9mm, điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là: bệnh lép hạt, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn cổ bông, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện sớm những diện tích lúa mắc bệnh, có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây Vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc, vải đang trong giai đoạn phát triển quả mạnh, diện tích vải trong giai đoạn phát triển quả chuẩn bị thu hoạch trải rộng trên các tỉnh, nhiệt độ cần cho sự sinh trưởng phát triển của vải là từ 24-29°C, cây vải không bị ảnh hưởng khi nhiệt độ tới 40°C, biên độ nhiệt độ ngày đêm chênh lệch càng lớn thì sự sinh trưởng của vải càng tốt, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này và tuần tới dao động trong khoảng 22 - 34°C, với lượng mưa 64.9mm thích hợp cho vải phát triển. Một số loại sâu bệnh cần lưu ý trong giai đoạn này là: sâu đục đầu quả, rệp hại hoa và quả non.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả. Nhiệt độ ảnh hưởng đến phẩm chất và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 22 - 29.4°C, nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Tuy nhiên, cần lưu ý một số bệnh có hại như: bệnh thối rễ, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp bón thêm phân kali, lân làm tăng khả năng đề kháng của rễ cây đối với bệnh.

Cây ngô: Ngô xuân đang trong giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch, thời tiết hiện nay khá thích hợp cho quá trình thu hoạch ngô trong vùng, trong giai đoạn này chú ý bệnh sâu keo mùa thu hại ngô; thời tiết thích hợp giai đoạn thu hoạch là nắng ráo và không có mưa, theo thống kê, biên độ nhiệt dao động trong tuần này là 22 - 29.4°C, tổng lượng mưa dao động 29.9- 64.9mm phù hợp cho giai đoạn phát triển của ngô xuân. Ngô hè thu trong giai đoạn gieo hạt và lên cây con, điều kiện thời tiết thích hợp

là đủ ẩm và ẩm; với nền nhiệt độ trung bình 25.7 độ C, điều kiện khí hậu tuần này và tuần tới phù hợp với diện tích ngô hè thu mới gieo trồng cần lưu ý một số bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: sâu đục thân, bệnh rầy mềm, cần chủ động phun thuốc kịp thời và hiệu quả.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ được trồng từ đầu tháng 5, rau màu đang trong các giai đoạn cây con, phát triển thân lá và thu hoạch tùy thuộc vào diện tích gieo trồng khác nhau, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 22 - 29.4°C phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại rau màu trồng trong khu vực. Lưu ý sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển mạnh.

Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng 23.5 - 33.9°C và lượng mưa dự báo là 29,9mm, có thể nhận thấy xu thế nền nhiệt tuần kế tiếp tăng mạnh và lượng mưa dự báo giảm, do đó các cây trồng trong khu vực cần chú ý cung cấp đầy đủ nước và lưu ý các biện pháp phòng chống sâu bệnh cho phù hợp với thời tiết nắng nóng.

NGƯỜI THỰC HIỆN




Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT




Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

