



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tuần 2 tháng 8 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.1 - 33°C, nhiệt độ không khí trung bình 30°C, tổng lượng mưa là 108.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 181.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 34.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 59mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 13.2 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ 24-31/8 có nắng nóng; từ ngày 28-31/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TTDBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.0	27.2	29.6	290.2
Trong tuần	33.0	27.1	30.0	108.8
Tuần tới	34.3	29.4	31.8	49.8

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: Lúa hè thu đang trong giai đoạn đòng - trổ - chín và thu hoạch, thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28-30°C. Lúa mùa sớm và chính vụ giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ và chín, với nhiệt độ thích hợp là 25-32 độ C. Lúa muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, với nhiệt độ thích hợp là 25-32°C. Tuần này nhiệt độ dao động từ 27.1 - 33°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 108.8mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tuy có giảm so với tuần trước nhưng vẫn khá lớn, điều kiện thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần lưu ý sâu bệnh chính là: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng, trong khi lượng mưa giảm mạnh (tổng lượng mưa dự báo gần 50mm), do đó, cần chú ý cung cấp đủ nước cho cây trồng, lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong tuần kế tiếp: bệnh hại lúa, bệnh bạc lá.

Mía: tiếp tục giai đoạn cây con, nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 2 tháng 8 dao động trong dao động 27.1 - 33°C, nhiệt độ không khí trung bình 30°C, tổng lượng mưa là 108.8mm, có thể nhận thấy tuần này mưa nhiều, đồng thời nền nhiệt cao không thật sự thích hợp cho mía phát triển, cần lưu ý

một số loại sâu chủ yếu như bọ hung, rệp, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời. Dự báo tuần tới nhiệt độ tăng so với tuần này, dao động từ 29.4- 34.3°C, lượng mưa giảm mạnh, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây trồng và chú ý một số loại bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết này: bệnh đốm vòng, bệnh thối ngọn.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.1 - 33°C, nhiệt độ không khí trung bình 30°C, tổng lượng mưa là 108.8mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng đồng thời lượng mưa có xu thế giảm đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu: ong ăn lá, xén tóc đục thân.

Sắn: diện tích sắn trong khu vực tiếp tục ở giai đoạn hình thành củ và phát triển củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động trong khoảng 27.1 - 33°C, phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý bệnh sùng trắng gây hại trên cây sắn. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng và lượng mưa giảm mạnh, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho quá trình thu hoạch sắn trên các diện tích cây trồng trong khu vực; cần tiếp tục lưu ý bệnh khảm vi rút, bệnh chổi rồng.

Ngô: trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 27.1 - 33°C, với lượng mưa tổng tương đối cao 108.8mm, do đó, người dân cần lưu ý đảm bảo thoát nước kịp thời cho ruộng ngô trong trường hợp có mưa lớn xảy ra sinh ngập úng ruộng. Cần lưu ý rệp muội, sâu xám thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm mạnh và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý bệnh gỉ sắt và bạch tạng.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra quả, thu hoạch tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là dưa hấu, đậu bắp, lơ xanh sớm... Nhiệt độ trung bình tuần này là 30 độ C, tăng nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh chết cây con, bệnh lở cổ rễ. Theo dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (hơn 1 độ C), lượng mưa giảm mạnh (khoảng 50mm), cần lưu ý một số loại sâu trên rau màu như: sâu tơ, sâu khoang.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): tiếp tục giai đoạn quả non. Nhiệt độ tuần dao động từ 27.1 - 33°C, với lượng mưa 108.8mm, lượng mưa tương đối lớn không thực sự phù hợp giai đoạn phát triển quả non trên cây có múi. Nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp

có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo giảm đáng kể, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây ăn quả và một số loại bệnh như: bệnh loét, bệnh chảy gôm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 29.4 - 34.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.8°C, tổng lượng mưa là 49.8mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý cung cấp nước đầy đủ, có biện pháp chăm sóc cây và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng