



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 11 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 13.9 - 19.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C, tổng lượng mưa là 18.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 12.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 6.0\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 15.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-08/12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Từ ngày 09-12/12, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.3	15.2	17.7	5.6
Trong tuần	19.5	13.9	16.7	18.1
Tuần tới	23.0-26.0	11.0-14.0	17.0-20.0	0.0-5.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lạc: đang giai đoạn cây con - phát triển thân lá, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ $13.9 - 19.5^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C , tổng lượng mưa là 18.1mm. Khi nhiệt độ tối thấp xảy ra cần chú ý biện pháp chống rét cho lạc như sử dụng NPK, phân hữu cơ, phân vi sinh để tưới cho cây rau phục hồi và giữ ấm cho cây, che chắn cho cây; cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu ăn tạp, bệnh lở cổ rễ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Proclaim 1.9EC, Limater 7.5EC, Pesta 5SL, ... Dự báo tuần kế tiếp cho thấy khu vực có nhiệt độ tối thấp dự báo dao động trong khoảng $11.0-14.0^{\circ}\text{C}$; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá, rầy mềm.

Cây vải là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Hiện nay diện tích vải đang trong giai đoạn chăm sóc - phát triển. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ $13.9 - 19.5^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C , tổng lượng mưa là 18.1mm; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25EC; Sutin 5EC; Oshin 20WP; Cruiser plus 312,5PS, ... Theo số liệu dự báo

tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu.

Cây ăn quả có múi: trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 13.9 - 19.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C, tổng lượng mưa là 18.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole, Difenoconazole. Số liệu dự báo cho thấy tuần tới khu vực Đông Bắc có nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét.

Cây ngô: ở giai đoạn vụ đông đang giai đoạn xoáy nõn - trổ cờ, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C. Theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 13.9 - 19.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C, tổng lượng mưa là 18.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Vibas 10 H, Vicarp 4 H, Vifurasn 3G, Padan 95SP, ... Dự báo tuần tiếp theo tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại.

Cây rau màu: khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 13.9 - 19.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C, tổng lượng mưa là 18.1mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC, ... đồng thời cần có biện pháp chống rét phù hợp cho rau màu như: tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu 5 - 10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, sinh vật gây hại. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo dao động trong khoảng 11.0-14.0°C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây sắn: đang giai đoạn tích lũy tinh bột - thu hoạch. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 13.9 - 19.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.7°C, tổng lượng mưa là 18.1mm; cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 585EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, sâu ăn lá.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, tổng lượng mưa dự


báo từ 0.0-5.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ thấp, nhiệt độ tối thấp dự báo dưới 15 độ C, do đó cây trồng cần đảm bảo tưới đủ nước và dinh dưỡng để tăng sức đề kháng tăng khả năng chống rét và đảm bảo đủ ẩm đồng thời có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng