



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC NAM BỘ  
Tuần 3 tháng 11 năm 2021**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Nam Bộ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm .5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm .5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm .5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 288mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 137.5$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 403.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: từ ngày 02-10/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31	25.1	28	125.1
Trong tuần	32.3	24.8	28.5	413.1
Tuần tới	30-33	21-24	25,5-28,5	5-15

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** Lúa thu đông - mùa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng, trổ, chín, thu hoạch. Lúa đông xuân 2021 – 2022 đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng – trổ, chín. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Trong giai đoạn đẻ nhánh cần phải giữ mực nước ở mặt ruộng khoảng 1-3cm; trong giai đoạn làm đòng và trổ bông, lúa rất mẫn cảm với nước, thiếu nước lúa sẽ bị nghẹn đòng, trổ bông không đều, hạt lép nên phải điều tiết nước hợp lý. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm. Giai đoạn lúa làm đòng cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính là: bệnh đạo ôn lá, rầy hại lúa, sâu cuốn là nhỏ, sâu đục thân, giai đoạn lúa chín cần lưu ý đến chuột hại.

**Cây rau màu:** đang trong nhiều giai đoạn phát triển, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ thích hợp với các loại rau màu khu vực Nam Bộ, cần bổ sung tưới nước cho cây rau màu; lưu ý các loại sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển.

Dừa: đang trong các giai đoạn, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần tưới nước bón phân để cây phát triển ổn định. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm. Đề phòng bọ cánh cứng, bọ dừa, kiến vương, bọ xít và làm cỏ tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): đang trong nhiều giai đoạn, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ ra hoa kết trái, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, điều kiện khí tượng tuần tới nhiệt độ thích hợp với sự phát triển của cây, cần bổ sung tưới nước cho cây. Cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành, bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, diệt cỏ dại, dùng thuốc trừ sâu bệnh tại nhiều vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Cây xoài: đang trong giai đoạn nuôi quả, thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Cây xoài đang trong giai đoạn nuôi quả bón phân cần được bón sâu để tránh bốc hơi. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm. Trong giai đoạn này của cây xoài cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, bệnh thán thư, phấn trắng, xỉ mù thân gây hại cho Xoài ở các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, ...

Mít: đang trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Cây mít trong giai đoạn nuôi quả cần bón phân để cây phát triển quả. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định. Trong giai đoạn này của cây mít cần lưu ý các loại sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, sâu đục trái, rệp sáp ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang.

Sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Lưu ý một số sâu bệnh hại thường xuất hiện trên cây sầu riêng: Rầy phấn; nhện đỏ, rầy lửa; sâu đục thân, đục cành; các bệnh do nấm *Phytophthora palmivora* gây nên; thối vỏ chầy nhựa tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong

khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định.

Cây thanh long: đang trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Trong giai đoạn này của cây thanh long cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, ruồi vàng hoặc hiện tượng nứt vỏ trái ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định.

Cây chôm chôm: đang trong giai đoạn chăm sóc, phát triển thân lá. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Điều kiện khí tượng tuần qua tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định. Trong giai đoạn này của cây chôm chôm cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, rệp sáp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ...

Cây cao su: đang trong giai đoạn chăm sóc, khai thác mủ, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Cây cao su trong giai đoạn này nhiệt độ thích hợp từ 20-28°C, nhiệt độ tuần này hơi cao cho sự phát triển của cây, cần bổ sung nước và làm mát cho cây. Đề phòng một số bệnh chính trên cây cao su thời kỳ này là: bệnh phấn trắng, bệnh héo đen đầu lá, bệnh nấm hồng. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định. Trong giai đoạn này của cây chôm chôm cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, rệp sáp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ...

Điều: đang trong giai đoạn phát triển thân lá, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Tuần này với nhiệt độ không khí và lượng mưa thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng, tuy nhiên, giai đoạn này cần bón phân, chăm sóc để cây phục hồi và phát triển ổn định. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định. Cần lưu ý đề phòng bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, sâu đục rệp lá,...tiếp tục gây hại tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương.

Sắn: đang trong giai đoạn phát triển thân lá, phát triển củ, thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu: bệnh thối củ, bệnh khảm lá do virus tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định.

Hồ tiêu: trong giai đoạn nuôi quả, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Trong giai đoạn nuôi quả nhiệt độ không khí và lượng mưa tuần này thuận lợi cho sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn này cần thường xuyên theo dõi sâu bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời cắt bỏ các bộ phận cây bị bệnh, lưu ý đề phòng các loại bệnh héo chết nhanh, bệnh vàng lá thối rễ tơ, rệp sáp cành, gốc, tuyến trùng rễ tiếp tục gây hại hồ tiêu tại các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Bình Dương và Đông Nam Bộ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định.

Cây cà phê: đang trong giai đoạn phát triển thân lá, nuôi quả, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định. Trong giai đoạn này của cây cà phê cần lưu ý bệnh khô cành, gỉ sắt và bọ xít muỗi ở tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Cây ngô: đang trong giai đoạn cây con, phát triển thân lá, trổ cờ, thu hoạch. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Trong giai đoạn cây con, phát triển thân lá cần bổ sung nước để cây phát triển ổn định, cần đề phòng bệnh khô vằn, sâu keo. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định.

Mía: đang trong giai đoạn cây con, vươn lóng, cần bón thúc giúp cây mía vươn lóng mạnh, tăng năng suất, tăng chữ đường. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.8 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5°C, tổng lượng mưa là 413.1mm. Điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ

trung bình dự báo dao động trong khoảng 25,5-28,5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5-15mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, lượng mưa ít cần bổ sung nước cho cây phát triển ổn định. Đề phòng bệnh sâu đục thân, bông lá và làm cỏ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 21,0-33,0°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động từ 25,5-28,5°C, tổng lượng mưa của khu vực dao động 5-15mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ cao, lượng mưa rất thấp, cần che nắng, tưới nước cho cây trồng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả. Một số lưu ý về thời tiết trong tuần tới từ đêm 02-10/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thanh Tú**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**