



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TÂY BẮC
Tuần 2 tháng 11 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 15.5 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.5°C, tổng lượng mưa là 10mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 105.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/11, có mưa, mưa rào và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 23/11-01/12, có mưa vài nơi, từ ngày 25/11-01/12 ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. *Nguồn (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).*

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	17.8	21.5	115.9
Trong tuần	23.5	15.5	19.5	10.0
Tuần tới	25-28	13-16	19-22	5-20

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây ngô: tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá - trổ cờ. Ở thời kỳ này, yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây ngô tương đối khắt khe, cây ngô đòi hỏi bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng, nước tưới với độ ẩm của đất dao động từ 70-75% độ ẩm tối đa của đồng ruộng và nhiệt độ từ 24-25°C. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 2.0°C), lượng mưa của khu vực giảm mạnh so với tuần trước (với mức giảm của lượng mưa 105.9mm). Thời tiết lạnh, mưa ít gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình sinh trưởng và phân hóa cơ quan sinh sản ở cây ngô. Do đó, để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây ngô, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần chủ yếu: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu ăn lá, rệp hại cờ... Tuần tiếp theo, dự báo khu vực Tây Bắc tiếp tục có lượng mưa tương đối thấp, người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ngô.

Cây lạc: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – đâm tia. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc sinh trưởng từ 24-33°C. Tuần 2 tháng 11, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 15.5-23.5°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 10.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần không thuận lợi cho cây lạc phát triển. Cần chú ý, tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc, trong quá trình tưới cần kết hợp bón phân hợp lý để cây lạc sinh trưởng tốt và tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh và

thời tiết. Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu khoang, sâu gai, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá lạc... người dân cần theo dõi diễn biến bệnh để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Tuần 3 tháng 11, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 13-28°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 5-20mm. Cần chú ý, tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh đồng thời chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lạc trong thời gian tới.

Cây khoai tây: tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá. Nhiệt độ thích hợp cho cây khoai tây sinh trưởng từ 15-22°C. Khoai tây là loại cây ưa ẩm, việc thiếu nước sẽ khiến cho năng suất và chất lượng của cây khoai tây bị sút giảm, do đó, đất trồng khoai tây phải bảo đảm đủ ẩm. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 19.5°C, điều kiện nhiệt độ rất thích hợp cho cây khoai tây phát triển. Tuy nhiên, lượng mưa của khu vực chỉ đạt 10.0mm, không bảo đảm nhu cầu về nước của cây khoai tây. Sâu xám, nhện trắng, bọ trĩ, rệp, bệnh vi rút xoắn lùn... tiếp tục là các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây khoai tây trong tuần. Dự báo tuần tới, khu vực Tây Bắc tiếp tục thời tiết mưa ít, bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây khoai tây.

Cây sắn: tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây sắn sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 23-27°C. Tuần này, khu vực Tây Bắc có lượng mưa đạt 10.0mm, điều kiện thời tiết phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Bệnh khảm lá sắn, rệp sáp... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn, người dân cần tiếp tục theo dõi phát hiện những cây bị nhiễm bệnh và kịp thời thu gom tiêu hủy để hạn chế bệnh lây lan diện rộng đồng thời giữ được những cây sắn khỏe mạnh để làm giống cho vụ sau. Tuần tới, dự báo lượng mưa của khu vực dao động từ 5-20mm, người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục thu hoạch các diện tích sắn đã đạt thành phẩm.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả có múi phát triển từ 23-29°C và độ ẩm của đất 70-80%. Tuần 2 tháng 11, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 15.5-23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình đạt 19.5°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 10.0mm. Thời tiết lạnh và mưa ít là điều kiện không thuận lợi cho cây ăn quả có múi phát triển. Tuy nhiên, với những diện tích cây ăn quả đã cho thu hoạch, điều kiện thời tiết trong tuần rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: Sâu đục quả, sâu đục thân/cành, bệnh chảy gôm... Tuần 3 tháng 11, dự báo nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 19-22°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 5-20mm. Người dân cần chú ý, tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi, nhất là các diện tích cây ăn quả đang trong giai đoạn phát triển quả.

Cây vải: tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây vải sinh trưởng từ 23-26°C. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm. Cụ thể, nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực giảm 2.0°C so với tuần trước (tuần này nhiệt độ không khí trung bình đạt 19.5°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 21.5°C); lượng mưa tuần này của khu vực giảm 105.9mm (tuần trước lượng mưa của khu vực đạt 115.9mm, tuần này lượng mưa của khu vực đạt 10.0mm). Thời tiết lạnh và ít mưa rất thuận lợi

cho việc hãm lộc đông phát triển sớm. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải trong tuần: sâu đục thân/cành, nhện lông nhung, châu chấu hại vải... Tuần tới, dự báo khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động từ 13-28°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 5-20mm. Cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải.

Cây nhãn: tiếp tục trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Cây nhãn sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 21-27°C. Trong tuần, nhiệt độ thấp nhất của khu vực đạt 15.5°C, nhiệt độ trung bình đạt 19.5°C, nhiệt độ cao nhất đạt 23.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 10.0mm. Cây nhãn tiếp tục trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch, cần tiếp tục các biện pháp chăm sóc (tưới nước kết hợp bón phân hợp lý) giúp cây nhãn phục hồi sau một vụ thu hoạch quả. Sâu bệnh gây hại trên cây nhãn trong tuần: Sâu gặm vỏ, sâu đục thân/cành, bệnh đốm nâu... Tuần tới, lượng mưa của khu vực Tây Bắc tiếp tục ở mức thấp, cần lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây nhãn.

Cây chè: tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Cây chè sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 22-28°C. Tuần 2 tháng 11, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 19.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 10.0mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh, mưa ít khiến cho cây chè sinh trưởng kém dẫn đến năng suất búp chè thu hái được bị sụt giảm. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè chủ yếu: Bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây chè. Tuần 2 tháng 11, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động từ 13-28°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 5-20mm. Cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây chè.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 13-28°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động từ 19-22°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 5-20mm. Do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm cung cấp đầy đủ nước, dinh dưỡng, chủ động các biện pháp giữ ẩm cho cây trồng và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng