



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 19.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 10.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 20.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-04/01, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Từ đêm 04-06/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ đêm 06-12/01, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng đêm 06-07/01, đêm 08-09/01 và đêm 10-11/01 có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.4	17.8	21.1	11
Trong tuần	21.1	16.6	18.9	30.5
Tuần tới	26.0-29.0	16.0-19.0	21.0-24.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lạc vụ thu đông: đang giai đoạn ra hoa. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Proclaim 1.9EC, Limater 7.5EC, Pesta 5SL, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá, rầy mềm.

Mía: tiếp tục giai đoạn tích lũy đường với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 12 dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối thấp, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như bón phân cân đối, không bón quá nhiều phân đạm. Dự báo tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp trong khoảng 16.0-19.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm và dự báo nhiệt độ trung bình tuần kế tiếp dao động trong khoảng 21.0-24.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: sâu đục ngọn, bọ hung nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ofatox 400EC, Nitox 30EC.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn tích lũy bột - thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim. Theo dự báo nhiệt độ tối thấp trong khoảng 16.0-19.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối chổi rồng, sùng trắng.

Ngô vụ đông: đang giai đoạn chín sữa - thu hoạch, thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC... Dự báo tuần sau lượng mưa dao động trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu.

Rau vụ đông: đang trong các giai đoạn ra hoa, tạo quả và thu hoạch tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Azadirachtin, Emamectin Benzoate, ... Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp trong khoảng 16.0-19.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn thu hoạch, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 16.6 - 21.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 30.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Sagolex, Bassan, Trebon, Confidor, Cypermethrin, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ dự báo trung bình trong khoảng 21.0-24.0°C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-


19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, các cây trồng vụ đông cần lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp kết hợp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng