



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 28.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 16.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 40.4mm, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; riêng ngày 24 và 25/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 25-26/4, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27/4-01/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 30/4 và 01/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.0	23.1	27.0	26.8
Trong tuần	28.9	23.8	26.3	55.4
Tuần tới	35.0-38.0	22.0-25.0	28.5-31.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: đang trong giai đoạn làm đòng. Nhiệt độ thích hợp giai đoạn làm đòng của lúa là từ 25 - 32°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh đạo ôn, sâu gai. Khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng các thuốc đặc hiệu để phun trừ bệnh như: Beam 75WP, Filia 525SC, Kabim 30WP, Trizole... Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa dự báo giảm mạnh (khoảng 30mm), cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần tới như: bệnh thối thân, nhện gié.

Mía: trong giai đoạn đẻ nhánh, với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 4 dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh trắng lá, rệp sáp đỏ; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như: bóc lá và dùng tay để giết rệp hoặc dùng thuốc Supracid 40ND pha với nước, nồng độ 0,1-1,15% phun ướt đầm khắp thân và lá mía bị bệnh. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, nhiệt độ trung bình dự báo dao động từ 28.5-31.5°C, lượng mưa giảm khoảng 30mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh thối đỏ, sâu bốn vạch.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: sâu đục ngọn, bọ hung nâu, bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 20-32°C, theo thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực nền nhiệt tuần này dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: rệp sáp, bệnh khảm vi rút. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng so với tuần này trong khi lượng mưa dự báo giảm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Ngô: trong giai đoạn cây con - trở cờ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 20-30°C. Thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần phù hợp cho ngô phát triển. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô, khi ngô mới chớm phát bệnh, để tránh lây lan có thể dùng Boocđo 1%, Aliette 80WP (0,3%), Rhidomil MZ 72BGN (2,5 kg/ha), Zineb (2,5kg/ha); Antracol 80WP (0,3%). Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết và lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là rau muống, cà chua, đậu bắp... Theo thống kê, nhiệt độ tuần này dao động từ 23.8 -

28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang. Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh (khoảng 30mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn quả non. Nhiệt độ thích hợp cho cây trồng giai đoạn này là 25 -27°C. Theo thống kê số liệu khí tượng các trạm thực đo trong khu vực, nhiệt độ tuần dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.3°C, tổng lượng mưa là 55.4mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa. Nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm (khoảng 30mm); cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo tuần tới trong khoảng 35.0-38.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng cao và lượng mưa dự báo giảm, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp như đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng vào những ngày nhiệt độ cao, sử dụng các biện pháp chống nóng cho cây như: phủ rạ mặt ruộng, làm giàn che lưới và thường xuyên duy trì nước trong rãnh giữa các luống để làm mát đất... và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng