



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Tuần 2 tháng 5 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 16.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 23.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 11.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 23-25/5, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26-31/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi chiều tối và đêm ngày 27 và 28/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.3	21.2	24.8	54.9
Trong tuần	29.1	23.0	26.0	71.5
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: trong khu vực đang ở giai đoạn đòng đuôi và thu hoạch, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 25-33°C. Theo thống kê số liệu khí tượng thực đo trong khu vực, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vàng lùn, sâu đục thân hai chấm; người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh như sử dụng một trong các loại thuốc sau: DuponTMprevathon 5SC, Virtako 40WG, Alocbale 40EC, Regent 800WG, Enasin 32WP... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới dao động trong khoảng 40.0 - 80.0mm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển quả và một số diện tích vải thiều sớm đã bước vào giai đoạn thu

hoạch. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm, phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây vải, tuy nhiên cần lưu ý một số sâu bệnh như: sâu đục cuống quả, bọ xít; có thể áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tác hại của sâu bệnh trên vải như: sử dụng các loại thuốc Cyperan 10 EC; Javitin 3.6; Emalusa 20,5 EC; Tasieu hoặc Peran 50EC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 28.5-31.5°C), lượng mưa dao động từ 40.0-80.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh sương mai, nhện lông nhung.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả, ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, sâu đục trái; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như: Kasuran 47WP, Kasumin 2L... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 40.0-80.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp.

Cây ngô: Ngô ở giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch, nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển là từ 20 - 30°C. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần này của khu vực Đông Bắc cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp như bệnh khô vằn, sâu xám; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để xử lý kịp thời và hiệu quả như dùng thuốc: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh phấn đen, châu chấu.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C. Thống kê số tuần này nhiệt độ dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm, nên nhiệt độ tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C và lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 40.0-80.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây lạc: đang giai đoạn đâm tia - phát triển củ. Nhiệt độ thích hợp cho lạc phát triển là từ 24 - 33°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.0 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.0°C, tổng lượng mưa là 71.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo

dao động trong khoảng 40.0-80.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-80.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc dự báo có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng