



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 5 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 21.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 36.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 23-25/5, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26-31/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.3	23.8	27	59.3
Trong tuần	33.2	25.5	29.3	66.9
Tuần tới	34.0-37.0	25.0.5-28.0	29.5-32.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: đang giai đoạn chắc xanh, đò đuôi và thu hoạch; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nền nhiệt độ tuần này dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: bón cân đối N, P, K, khi xuất hiện mật độ ≥ 2.000 con/m² thì phun thuốc trừ rầy. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, điều kiện tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ăn quả. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong

khoảng 29.5-32.5°C), lượng mưa có xu hướng giảm (lượng mưa dao động 20.0-40.0mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển từ 25 - 30°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy thời tiết tuần này dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, khi phát hiện diện tích sâu bệnh có thể phun Nuvacron 0,1 – 0,15%, Diaphos 50EC, Pyrinex 20EC, Vibasu 40ND, Saivina 430SC, Cyper 25EC... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển quả. Nhãn là một trong những cây trồng ở Hưng Yên và Hải Dương. Nhiệt độ thích hợp cho nhãn phát triển giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 5 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần phù hợp cho nhãn phát triển; cần lưu ý bệnh khô cành, sâu đục nõn trong giai đoạn này. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng (nhiệt độ tối cao dao động trong khoảng 34.0-37.0°C, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục quả.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực, nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, lưu ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; khi phát hiện diện tích sâu bệnh có thể sử dụng một số thuốc trừ bệnh phổ biến để phun phòng trừ bệnh như Tilt super 300ND 1% (0,5 – 0,75 lít/ha) hay Topsin M – 70WP (0,4 – 0,6 kg/ha). Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 20.0-40.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu.

Cây rau màu: trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, phần lớn diện tích rau màu khu vực Đông Bằng Bắc Bộ đang trồng các loại rau có khả năng chịu nhiệt cao. Thống kê số liệu khí tượng tuần 2 tháng 5 cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C), lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0- 40.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh xoắn trùn ngón, bọ nhảy.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển củ và thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 25.5 - 33.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 66.9mm, nhiệt độ phù hợp cho lạc

phát triển. Trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Emamectin; Lufenuron hay hỗn hợp (Chlorantraniliprole + Abamectin) ... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ dự báo có xu hướng tăng (nhiệt độ tối cao dao động trong khoảng 34.0-37.0°C), cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dự báo có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lựa chọn biện pháp chống nóng cho cây trồng như: căng bạt chống cháy lá, làm nhà lưới, hệ thống tưới nước thường xuyên đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng