



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Tuần 1 tháng 6 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 6 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 25.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 29.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 105.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ chiều và đêm 12-14/6, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15-16/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17-21/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 32.6 | 26.2 | 29.4 | 68.7 |
| Trong tuần | 33.7 | 26.8 | 30.2 | 94.1 |
| Tuần tới | 34.0-37.0 | 23.0-26.0 | 28.5-31.5 | 150.0-250.0 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: đang ở giai đoạn đòng đầu - thu hoạch; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-30°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm, không thực sự phù hợp cho giai đoạn phát triển này của lúa trong khu vực, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh đốm vòng, sâu cuốn lá lớn; người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số loại thuốc như Padan 95SP, Regent 800WP, Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0 °C và lượng mưa tăng mạnh với tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 150.0-250.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh đạo ôn, sâu gai.

Cây ăn quả có múi: tiếp tục giai đoạn phát triển quả. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng

mưa là 94.1mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa.

Cây ngô hè thu: đang ở giai đoạn 2 đến 6 lá, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này của ngô là 25-30°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm, có thể nhận thấy nền nhiệt cao so với nhiệt độ yêu cầu cho giai đoạn phát triển này của ngô; cần chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá. Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy lượng mưa tuần tới có xu thế tăng mạnh (dự báo trong khoảng 150.0-250.0mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển quả. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 6 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm. Cần chú ý bệnh phấn trắng, xén tóc trong giai đoạn này, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc Score 250EC, Aliette 800WWG, Nativo 750WWG... Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ. Theo số liệu dự báo tuần tới khu vực có lượng mưa tăng đáng kể (dự báo trong khoảng 150.0-250.0mm), cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu.

Cây rau màu: trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 1 tháng 6 có nền nhiệt độ dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dipel 3.2WP, Biocin 16WP... Dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây lạc trong khu vực: đang ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 26.8 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 94.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng

nhẹ với nhiệt độ dự báo trung bình trong khoảng 28.5-31.5 độ C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muộn, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 150.0-250.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, đồng thời lượng mưa dự báo tương đối lớn (150.0-250.0mm); do đó cây trồng cần đảm bảo có biện pháp tiêu thoát nước phù hợp khi trận mưa lớn xảy ra để tránh ngập úng cục bộ như đào các mương tiêu quanh vườn hoặc vét rãnh sâu hơn để tạo điều kiện cho nước thoát nhanh ra các đường mương tiêu nước, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng