



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 8 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 101.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 10.9$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 22.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ ngày 14-15/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 19-21/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.9	27.6	29.7	134.2
Trong tuần	34.5	28.5	31.5	32.7
Tuần tới	34.0-37.0	27.0-30.0	30.5-33.5	40.0-70.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** trong giai đoạn đòng trổ- chín sấp với nhiệt độ thích hợp từ 20 -38°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh đạo ôn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Binhtryzol 75WP, Bamy 75WP, Kabim 30WP, Kasai-S 92SC... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu.

**Mía:** tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, thống kê số liệu từ các trạm khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 8 dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh căn mía gốc, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Nurelle 25/2,5EC, Azorin 400WP,... Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng so với tuần này với nhiệt độ trung bình dự báo dao động từ

30.5-33.5 °C, lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm với dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông, bệnh héo rũ, ong ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Banectin 1.8EC, Catex 1.8 EC, ...

Sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá - củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt trong tuần dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm, phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 585EC, ... Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần sau có xu hướng tăng với lượng mưa dao động từ 40.0-70.0mm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp.

Ngô: trong giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 20-30°C. Thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Ababetter 1.8 EC, 3.6EC, 5EC, Regent 1.8EC, 2WG, 3.6EC, 5EC, ... Dự báo tuần sau cho thấy nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là hành lá, bí xanh, xà lách, cà chua... Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm; điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sagosuper, Karate, Pyrinex, Diaphos, Sherzol, BayFidan, ... Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với nhiệt độ lớn nhất dự báo dao động trong khoảng 34.0-37.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 28.5 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 32.7mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh ghẻ nám, bệnh loét; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Funguran, COC 85, Norshield 86.2 WG, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.5-33.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, người dân bên cạnh lựa chọn các kỹ thuật chăm sóc cây trồng phù hợp thì cần áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả cho từng loại cây.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**