



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 1 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.7$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.4$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-08/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, phía Nam trưa chiều trời nắng; riêng đêm 02-03/02 phía Nam có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 08-10/02, phía bắc có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.7	12.7	15.2	8.0
Trong tuần	23.4	15.3	19.3	2.2
Tuần tới	21.0	17.0	19.0	4.5

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa Xuân sớm ở các giai đoạn: mạ 1,5 - 3 lá; gieo; cấy và bén rễ hồi xanh. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ trong khu vực dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này tương đối thấp đối với giai đoạn phát triển này của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có giảm nhẹ so với tuần này, lượng mưa tăng, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng.

Mía: tiếp tục giai đoạn thu hoạch, với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này của Mía là 20-25°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 1 dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp cho mía phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần tới nhiệt độ có giảm nhẹ so với tuần này, dao động từ 17.0- 21.0°C, lượng mưa tăng khoảng 4.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh than, sâu mình hồng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung

bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp nhiệt độ có xu thế giảm trong khi lượng mưa tăng nhẹ; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông, bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm, không thực sự phù hợp cho sắn phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau giảm nhẹ và lượng mưa tăng, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bọ trĩ, bệnh thối củ.

Ngô xuân: đang trong giai đoạn gieo - 3 lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, một hại thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa tăng và nhiệt độ giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cải bắp, cà chua, xà lách... Nhiệt độ tuần này dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ giảm nhẹ (0.3 độ C), lượng mưa tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần này dao động từ 15.3 - 23.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 2.2mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm đen, bọ xít xanh. Nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng giảm và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0 - 21.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 4.5mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần này (0,3 độ C), lượng mưa có xu hướng tăng, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần sau tương đối thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng trong khu vực, tuy nhiên cần chú ý sử dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả và phù hợp cho từng loại cây.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**