


THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 1 năm 2021


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 1 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 8.5 - 14.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 0.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 25-27/01, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 27-28/01, có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 29/01-31/02, có mưa vài nơi, riêng từ ngày 30/01 đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét. Từ ngày 01-02/02, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	10.5	7.5	9.0	4.8
Trong tuần	14.6	8.5	11.6	0.1
Tuần tới	22.7	12.5	17.6	2.7

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: Mạ chiêm xuân sớm ở giai đoạn 3 - 5 lá; lúa sạ giai đoạn gieo, đẻ nhánh và tủa dậm; điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là $28-30^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho sinh trưởng phát triển của lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ $8.5 - 14.6^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C , tổng lượng mưa là 0.1mm, có thể nhận thấy nhiệt độ tuần này trong khu vực khá thấp, không thuận lợi cho phát triển của lúa. Sâu bệnh chính giai đoạn này là sâu gai, sâu đục thân hai chấm; bên cạnh việc thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh thì người dân cũng cần sử dụng các biện pháp chống rét cho lúa như: những ngày có sương muối giá buốt, cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng, không bón đạm, NPK cho mạ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa đều có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: rầy nâu, sâu phao.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải vẫn đang giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Theo thống kê nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 8.5 - 14.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 0.1mm. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, bọ xít. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh khô cành, nhện lông nhung.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 8.5 - 14.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, điều kiện khí hậu không thật sự thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng; cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.

Cây ngô: Ngô ở giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 8.5 - 14.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không thuận lợi với giai đoạn phát triển này của cây ngô. Cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 8.5 - 14.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, nên nhiệt bất lợi với quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu trong khu vực, đặc biệt những cây chịu rét kém. Trong tuần này, người dân bên cạnh việc chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa thì cần áp dụng các biện pháp chống rét hiệu quả cho rau màu như: tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu 5-10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, tiến hành thụ phân nhân tạo, thụ phân bổ sung cho các loại rau ăn quả. Theo số liệu dự báo

tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây lạc: đang giai đoạn phát triển củ và thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Theo thống kê, tuần này nhiệt độ dao động từ 8.5 - 14.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, cần chú ý bệnh đốm lá muện, rầy mềm. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 12.5 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.6°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, các cây trồng cần lựa chọn biện pháp chăm sóc và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng