



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 1 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 1 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 25-27/01, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 27-28/01, có mưa rải rác, trời rét. Từ 29/01-31/02, có mưa vài nơi, riêng từ ngày 30/01 đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét. Từ ngày 01-02/02, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, sau có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.1	11.2	14.1	1.1
Trong tuần	17.9	12.1	15.0	1.5
Tuần tới	23.6	15.0	19.3	0.8

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 2 tháng 1 diện tích lúa chiêm xuân sớm ở giai đoạn 3 - 5 lá; lúa sạ ở giai đoạn đẻ nhánh và tủa dậm; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-30°C, nên nhiệt độ tuần này dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng không thuận lợi cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp chống rét cho cây lúa như: khum vòm phủ kín bằng nilon trắng cho mạ; rắc tro bếp mục lên trên mặt luống để giữ ấm cho mạ, người dân cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần này dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh cháy gôm, rệp sáp bông. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí

trung bình tăng lên 19.3°C, lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh thán thư, nhện.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch; nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển là 24 đến 30°C, thời tiết tuần này có nhiệt độ dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm, có thể nhận thấy thời tiết tuần này không thuận lợi cho ngô phát triển; cần lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh thối thân, sâu cắn lá. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng (gần 3 độ C) và tổng lượng mưa dự báo giảm so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Cây nhãn: tiếp tục giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 1 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Cần lưu ý bệnh phấn trắng, xén tóc trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp.

Cây chè: đang trong giai đoạn thu hái và đốn tĩa, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm, chú ý một số bệnh: bệnh đốm trắng, bọ xít. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, nhện nâu.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 1 có nền nhiệt độ dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa. Nhiệt độ trong tuần tương đối thấp, bất lợi cho quá trình sinh trưởng phát triển của rau màu, đặc biệt những cây chịu rét kém. Bên cạnh việc phòng trừ sâu bệnh thì người dân có thể áp dụng một số biện pháp như sau: che nilon trắng để tránh mưa rét, Bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP... để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Theo số liệu thống kê, tuần 2 tháng 1 có nền nhiệt độ dao động từ 12.1 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0°C, tổng lượng mưa là 1.5mm, nhiệt độ tương đối thấp so với khoảng nhiệt độ phát triển thuận lợi của cây lạc. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15 - 23.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 0.8mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chăm sóc đúng kỹ thuật và sử dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng