



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 2 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 19.7 - 28.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.9°C, tổng lượng mưa là 2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21/02-03/03, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29	21.6	25.3	2.5
Trong tuần	28.2	19.7	23.9	2
Tuần tới	27.5	18.4	22.9	1.5

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: vụ Đông Xuân trà sớm đang trong giai đoạn làm đòng – trổ, trà chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái, trà muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Giai đoạn trổ bông, làm hạt nhiệt độ tốt nhất từ 28 – 30°C. Với nhiệt độ dự báo dao động từ 19.9 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.2°C, tổng lượng mưa là 6.6mm, cho thấy nhiệt độ thấp hơn so với ngưỡng điều kiện phát triển tốt của cây lúa trong các giai đoạn này. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa là 2mm, cho thấy nền nhiệt độ vẫn tiếp tục thấp đối với các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa. Trong tuần, một số đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa Đông Xuân giai đoạn Làm đòng - Trổ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo dao động từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Cần đề phòng chuột gây hại trên các trà lúa, gây hại mạnh trên lúa gieo thẳng và lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh. Ốc bươu vàng lây lan theo nguồn nước. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn...gây hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Cây ngô: vụ Đông Xuân đang trong giai đoạn cây con - PTTL - Trổ cờ, phun râu. Giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C. Độ ẩm thích hợp nằm trong khoảng 60 – 65% (65-70%). Lượng nước cần khoảng 28 – 35m<sup>3</sup>. nước/ngày/ha. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa là 2mm, không phải điều kiện thuận lợi cho ngô ở các giai đoạn này

khi nhiệt độ tối thấp thấp hơn ngưỡng thích hợp của cây ngô. Trong tuần sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng trên ngô Đông Xuân tại các vùng trồng ngô. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo dao từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Lưu ý phòng trừ sâu đục thân, đốm lá nhỏ, bệnh khô vằn, hiện tượng lùn xoắn lá, chuột,... tiếp tục hại.

Sắn: vụ Hè Thu 2020 giai đoạn nuôi củ, thu hoạch; vụ Mùa và Thu Đông đang trong giai đoạn phát triển thân lá; vụ Đông – Xuân 2020 – 2021 đang trong giai đoạn xuống giống – cây con. Thời kỳ phát triển của mầm, cây con, phát triển thân lá, sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa là 2mm, tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần, bệnh khảm lá tiếp tục lây lan và gia tăng diện tích nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn; rệp sáp bột hồng tiếp tục phát sinh và gây hại trên mía giai đoạn đẻ nhánh tích cực - Vươn lóng tại địa phương đã từng phát hiện trước đây. Đối với tuần tiếp theo, nhiệt độ dự báo dao từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Lưu ý phòng trừ các đối tượng gây hại cho sắn như rệp sáp bột hồng... bệnh khảm lá.

Rau màu: trong nhiều giai đoạn. Sâu tơ; bọ nhảy,... hại tăng trên rau ăn lá ở các tỉnh phía Bắc; sâu xanh, sâu khoang,... hại cục bộ; bệnh thán thư, thối nhũn,.. hại tăng trên cây họ cà; dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ.

Mía: đang trong giai đoạn tạo đường, thu hoạch. Thời kỳ tạo đường nhiệt độ cần thấp dưới 20°C và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm để giúp cho quá trình chuyển hóa và tích lũy đường được tốt, độ ẩm trong đất dưới 70% để cho quá trình sinh hóa tiến triển được thuận lợi. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa 2mm, là điều kiện thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần, Bệnh chồi cỏ,... tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo dao từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Cần lưu ý phòng trừ các đối tượng dịch hại như rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân.

Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa 2mm, là điều kiện thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Trong tuần, bệnh đốm nâu, thán thư, ...phát sinh gây hại tăng. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo dao từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Cần tiếp tục phòng trừ các loại bệnh, sinh vật gây hại cho cây trồng.

Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa

khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa 2mm, là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo dao động từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Lưu ý các bệnh gây hại cho sầu riêng như nấm hồng, thối góc, bệnh thán thư....

Hồ tiêu: đang trong giai đoạn chắc xanh, chín bói. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê tuần 2 tháng 2 nhiệt độ dao động từ 19.7°C đến 28.2°C, nhiệt độ trung bình 23.9°C và tổng lượng mưa 2mm, là điều kiện thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Trong tuần, tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo dao động từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm. Cần lưu ý tăng cường chăm sóc các vườn cây đang bị nhiễm bệnh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.4 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 1.5mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**