



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 2 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 13 - 22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 58mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 1.8\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-25/6, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 26/2-03/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.5	13.0	16.8	63.3
Trong tuần	22.5	13.0	17.7	5.3
Tuần tới	24.5	17.1	20.8	2.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: lúa vụ Đông Xuân trà mạ đang trong giai đoạn gieo – 3 lá – nhỏ cây, trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh, trà lúa muộn đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh. Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này từ $25-32^{\circ}\text{C}$. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần trước dao động từ $13-22.5^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C , tổng lượng mưa của khu vực giảm mạnh 5.3mm. Với điều kiện thời tiết như trên nhận thấy tuần này thời tiết không thuận lợi cho cây lúa phát triển. Người dân cần chú ý: Duy trì mực nước trong ruộng lúa 3-5cm bảo đảm giữ ẩm cho cây lúa cũng như giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe và tăng các nhánh hữu hiệu; Chủ động bón thúc cho cây lúa; Lưu ý một số sâu bệnh hại chính: Bệnh nấm mốc, rầy trắng nhỏ, rầy xanh đuôi đen, chuột, ốc brou vàng phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ dao động $17.1-24.5^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm 2.6mm, cần lưu ý: Tiếp tục bổ sung nước cho cây lúa bảo đảm duy trì mực nước trong ruộng 3-5cm và

theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại có khả năng phát sinh trong tuần tới: rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm, ốc bươu vàng, chuột...

Cây ngô Đông: cơ bản đã bước vào giai đoạn chín, nhiều diện tích đã cho thu hoạch; Cây ngô Xuân hiện đang trong giai đoạn xuống giống gieo – 3 lá. Theo số liệu thực đo từ các trạm trong khu vực, tuần này nhiệt độ của khu vực dao động 13-22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, lượng mưa của khu vực 5.3mm. Trong giai đoạn gieo – 3 lá, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô nảy mầm 25-30°C và độ ẩm thích hợp trong khoảng 60-70% độ ẩm tương đối. Thời tiết trong tuần với nền nhiệt độ tương đối thấp và hầu như không có mưa là điều kiện không thuận lợi cho cây ngô phát triển. Trong quá trình chăm sóc người dân cần lưu ý: Tưới nước bổ sung cho cây ngô để bảo đảm nảy mầm và phát triển thuận lợi. Trong tuần cây ngô chịu ảnh hưởng của một số đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu: Sâu keo mùa thu, sâu xám,..gây hại cục bộ. Dự báo tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần này, tuy nhiên, lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm 2.6mm; Cần lưu ý: tiếp tục tưới nước bổ sung cho cây ngô và các loại sâu bệnh có khả năng tiếp tục phát sinh trong tuần tới: Sâu đục thân, sâu đục bắp.

Cây lạc Xuân: hiện đang trong các giai đoạn gieo – cây con – 2 lá. Cây lạc phát triển tốt ở điều kiện 24-33°C. Trong tuần nhiệt độ của khu vực dao động 13-22.5°C, trung bình 17.8°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 5.3mm. Nhiệt độ thấp và lượng mưa không đáng kể, có thể nhận thấy tuần này thời tiết không thuận lợi cho cây lạc phát triển. Cần chú ý: Bổ sung thêm nguồn nước cho cây lạc, bảo đảm đất đủ ẩm để các diện tích lạc mới gieo có khả năng nảy mầm tốt, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh hại chính: bệnh lở cổ rễ, sâu xám, sâu khoang. Tuần tới, dự báo nhiệt độ trung bình của khu vực tăng nhẹ (xấp xỉ 3.1°C), thời tiết ấm dần lên tuy nhiên lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm mạnh; Cần chú ý: tiếp tục bổ sung nước cho cây lạc và theo lưu ý một số sâu bệnh khả năng gây hại: bệnh lở cổ rễ, sâu xanh, sâu xám...

Cây khoai tây: tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ, phần lớn diện tích đã cho thu hoạch. Theo số liệu thực đo, tuần này nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần trước, dao động từ 13-22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.8°C, lượng mưa của khu vực giảm mạnh 5.3mm. Điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích khoai tây đã thành phẩm. Trong tuần cây khoai tây ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại chủ yếu: bệnh thối củ, bệnh chết cây. Tuần tới dự báo lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm 2.6mm; Lưu ý: tiếp tục thu hoạch các diện tích khoai tây đã đạt tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Cây chè: trong giai đoạn thu hái – đốn. Nhiệt độ của khu vực tuần này trong khoảng 13-22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.8°C, lượng mưa của khu vực 5.3mm. Chè là loại cây có yêu cầu điều kiện nhiệt độ không khí trung bình hàng năm

18-23°C và độ ẩm không khí trung bình >80%. Với điều kiện thời tiết như trên có thể thấy tuần này thời tiết không thực sự thuận lợi cho cây chè phát triển. Cần lưu ý một số sâu bệnh hại chính: bệnh thối búp, rầy xanh, bọ xít muỗi. Dự báo tuần sau, nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ, tuy nhiên lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm, khả năng phát sinh một số sâu bệnh hại: bọ cánh tơ, nhện đỏ.

Cây ăn quả có múi trong khu vực: đang trong giai đoạn phát triển quả, phần lớn diện tích đã cho thu hoạch. Tuần này nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 13-22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.8°C, lượng mưa của khu vực 5.3mm. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín, lưu ý một số sâu bệnh hại chính: nhện đỏ, ruồi đục quả. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần này dao động từ 17.1 - 24.5°C, lượng mưa của khu vực giảm 2.6mm, lưu ý một số sâu bệnh hại có khả năng phát sinh: bệnh chảy gôm, bệnh vàng lá thối rễ...


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.1 - 24.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.8°C, tổng lượng mưa là 2.6mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng nhẹ, lượng mưa tiếp tục giảm các cây trồng cần được chú ý bổ sung đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng