



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 19.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 17.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 4.9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 24-27/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ 28-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.1	20.3	23.7	22.5
Trong tuần	27.3	22.1	24.7	3.0
Tuần tới	21.8	16.4	19.1	20.1

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái. Nhiệt độ thích hợp cho thời kỳ đẻ nhánh của lúa là 25.0 - 32.0°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần này giảm mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh thối thân, nhện gié. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp giảm trong khi lượng mưa tăng, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần sau như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ.

Mía: bước sang giai đoạn phát triển thân lá với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 26.0 - 30.0°C. Theo thống kê, nhiệt độ tuần 2 tháng 3 dao động trong khoảng từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như dùng thuốc Supracid 40ND pha với nước, nồng độ 0,1-1,15% phun ướt đẫm khắp thân và lá mía bị bệnh. Dự báo tuần sau nhiệt độ giảm so với tuần này, dao động từ 16.4- 21.8°C, lượng mưa tăng khoảng

20mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: đang bước sang giai đoạn khai thác nhựa, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây thông là 20.0 - 25.0°C. Theo số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế giảm trong khi lượng mưa dự báo tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: sâu đục ngọn, bọ hung nâu, bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông.

Sắn: diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn mọc mầm và cây con, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 20.0 - 27.0°C. Theo thống kê, nền nhiệt trong tuần khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm, phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: rệp sáp, bệnh khảm vi rút. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau có xu hướng giảm và lượng mưa tăng, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ.

Ngô: trong giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 20.0 - 28.0°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu xám thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô, khi phát hiện diện tích ngô bị nhiễm bệnh, có thể dùng các loại thuốc đang phổ biến như Mospilan 3EC, Trebon 10EC phun 35-55 ml/ sào. Dự báo tuần sau lượng mưa tăng và nhiệt độ giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là xà lách, mồng tơi, rau muống, bí xanh... Theo thống kê, nhiệt độ trung bình tuần này là 24.7 độ C và lượng mưa là 3.0mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ giảm (gần 5 độ C), lượng mưa tăng (khoảng 20mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn ra phát triển lộc và ra hoa. Theo thống kê, nhiệt độ tuần dao động từ 22.1 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 3.0mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện sâu bệnh cần kịp thời xử lý, có thể sử dụng một số biện pháp như: dùng thuốc Selecron 500 EC, Trigard 100 SL, Trebon... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng giảm và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.4 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.1°C, tổng lượng mưa là 20.1mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm trong khi lượng mưa tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn các biện pháp chăm sóc phù hợp kết hợp với phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng