



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 14.6 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 22.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 23.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.6 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-15/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 16-21/3, có nhỏ mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng ngày 21/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.4	14.6	18.5	4.1
Trong tuần	21.8	14.6	18.2	26.3
Tuần tới	24.1	18.2	21.2	2.8

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa đông xuân giai đoạn bén rễ - hồi xanh, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 25-28°C. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 14.6 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh, những ngày có nhiệt độ tối thấp dưới 15 độ C thì cần bổ sung chất dinh dưỡng cho lúa để tăng khả năng đề kháng của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm đáng kể, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh virus lúa, sâu đục thân.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc và ra hoa. Nhiệt độ thích hợp cho vải ra hoa là 18 -24°C. Theo

thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 14.6-21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này của cây vải; cần chú ý bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển lộc và ra hoa. Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi ra hoa là từ 8 - 17 °C; theo thống kê điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 14.6-21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này của cây ăn quả có múi. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghè lõm, sâu vẽ bùa khi phát hiện sâu bệnh cần sử dụng các thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép như: CNX-RS, Victory 585 EC, Ortus 5SC. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 21.2 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 24mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp.

Cây ngô: đang ở giai đoạn 5 đến 7 lá, nhiệt độ thích hợp trong giai đoạn này từ 20 - 30°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 14.6-21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô do nền nhiệt trong tuần tương đối thấp, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong giai đoạn phát triển này như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm với tổng lượng mưa khoảng 24mm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 14.6-21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm, nền nhiệt tương đối thấp so với nền nhiệt thích hợp của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 21.2°C và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu vẽ bùa.

Cây lạc: đang giai đoạn mới trồng đến 3 lá. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 14.6 - 21.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 26.3mm, cần chú ý sâu xám, bệnh héo khô. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh lở cổ rễ, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.2 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.2°C, tổng lượng mưa là 2.8mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp từng giai đoạn phát triển và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng