



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 30.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 24-27/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh. Từ 28-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.7	18.7	20.7	33.3
Trong tuần	26.5	21.6	24.1	2.9
Tuần tới	22.5	18.4	20.5	8.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 2 tháng 3 diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộng; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25.0-32.0°C. Theo thống kê, nền nhiệt độ tuần này dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng một số biện pháp như: Camilo 150SC, Chevil 5SC, Nevo 330EC, Anvil 5SC, Rovral 50WP, Callihex 5SC, Hecwin 5SC, Til calisuper 300EC, ... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng giảm trong khi lượng mưa tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển lộc và ra hoa. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh. Theo số liệu dự báo

tần tới, nhiệt độ không khí trung bình giảm xuống 20.5°C, lượng mưa tăng khoảng 6mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sọc, rệp sáp.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn 5 lá - xoáy nõn. Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 20.0-30.0°C. Theo thống kê số liệu từ các trạm đo khí tượng trong khu vực, thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 24.1°C và lượng mưa 2.9mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; cần chú ý một số sâu bệnh phổ biến: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế giảm (hơn 4 độ C) và tổng lượng mưa dự báo tăng khoảng 6mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc và ra hoa. Cây nhãn cần một thời gian ngắn với nhiệt độ 15-22°C trong vài tuần để tiến hành phân hóa mầm hoa và sau đó là điều kiện nhiệt độ cao hơn khoảng 25-32°C cho hoa nhãn phát triển. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 3 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm, phù hợp với giai đoạn phát triển này của nhãn. Cần chú ý bệnh thán thư, sâu đục nõn trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế giảm trong khi lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh phòng lá chè, rầy xanh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng giảm và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, nhện nâu.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, theo số liệu thống kê, tuần 2 tháng 3 có nền nhiệt độ dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng giảm trong khi lượng mưa dự báo tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh xoắn lá, sâu xanh.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24.0-33.0 độ C. Theo thống kê số liệu khí tượng tuần này trong khu vực dao động từ 21.6 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 2.9mm. Trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh như: đốm lá sớm, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo có xu hướng giảm và lượng

mưa dự báo tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.4 - 22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 8.3mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ giảm và lượng mưa tăng, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc đúng kỹ thuật đối với từng loại cây đồng thời phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng