



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TÂY BẮC
Tuần 3 tháng 2 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 16.5 - 25.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 9.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 3.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 04-06/3 có rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 06-07/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 08-11/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.5	13.0	17.7	5.3
Trong tuần	25.6	16.5	21.0	9.7
Tuần tới	25.4	17.4	21.4	4.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: trà chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đẻ rộ, trà lúa muộn đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh – đẻ nhánh. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây lúa phát triển từ 25-32°C. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần trước trung bình khoảng 3.3°C, dao động trong khoảng từ 16.5-25.6°C, tổng lượng mưa của khu vực tăng không đáng kể đạt mức 9.7mm. Điều kiện thời tiết se lạnh, lượng mưa nhỏ là điều kiện không thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây lúa chịu ảnh hưởng của một sâu bệnh hại chủ yếu: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... Ngoài việc theo dõi sâu bệnh, người dân cần lưu ý bổ sung nước cho cây lúa: đối với lúa giai đoạn bén rễ hồi xanh – trước đẻ nhánh duy trì mực nước trong ruộng 1-3cm; đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh – đẻ rộ, cần tưới nước theo phương pháp “Ướt - Khô xen kẽ”, xem kẽ giữa các đợt lấy nước cần bón phân thúc cho cây lúa đẻ nhánh khỏe và tăng các nhánh hữu hiệu. Dự báo, tuần tiếp theo nền

nhiệt độ của khu vực cơ bản không có thay đổi nhiều so với tuần này, lượng mưa có xu thế giảm cần chú ý bảo đảm nhu cầu nước của cây lúa và tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây ngô Xuân: đang trong giai đoạn gieo – 3-5 lá. Trong giai đoạn gieo – 3 lá, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô nảy mầm 25-30°C, độ ẩm thích hợp trong khoảng 60-70% độ ẩm tương đối. Theo số liệu thực đo, nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 16.5-25.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 9.7mm. Điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi cho cây ngô phát triển. Trong tuần, sâu keo mùa thu tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu cho cây ngô. Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh, người dân cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước cho cây ngô bảo đảm nhu cầu nước của cây ngô trong giai đoạn này. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ dao động 17.4-25.4°C, lượng mưa của khu vực 4.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại: sâu keo mùa thu, sâu ăn lá....

Cây lạc Xuân: tiếp tục trong các giai đoạn gieo – cây con – 2 lá. Cây lạc phát triển tốt ở điều kiện 24-33°C. Nền nhiệt độ tuần 3 tháng 2 của khu vực Tây Bắc dao động trong khoảng 16.5-25.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 9.7mm. Với điều kiện như trên, có thể nhận thấy tuần này thời tiết không thuận lợi cho cây lạc phát triển. Trong tuần cây lạc chịu ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại: sâu xám, sâu khoang... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả, ngoài ra cần lưu ý nhu cầu nước cho cây lạc trong giai đoạn này bảo đảm cho các diện tích lạc phát triển tốt nhất. Dự báo tuần tiếp theo nền nhiệt độ của khu vực cơ bản ổn định, lượng mưa giảm hơn so với tuần này (đạt 4.3mm). Cần chú ý: tiếp tục bổ sung nước theo nhu cầu của cây lạc và lưu ý một số sâu bệnh khả năng gây hại: bệnh lở cổ rễ, sâu xanh, sâu xám...

Cây khoai tây: đang trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Theo số liệu thống kê từ các trạm trong khu vực, tuần này nhiệt độ của khu vực tăng mạnh với tuần trước, dao động từ dao động trong khoảng từ 16.5-25.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 9.7mm. Thời tiết mưa không đáng kể rất thuận lợi cho việc thu hoạch khoai tây. Trong tuần cây khoai tây ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại chủ yếu: bệnh thối thân, thối ướt củ. Tuần tới dự báo lượng mưa của khu vực có xu thế tiếp tục giảm đạt 4.3mm; Lưu ý: tiếp tục thu hoạch các diện tích khoai tây đã đạt tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Cây chè trong giai đoạn ra búp. Tuần 3 tháng 2 khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 16.5-25.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 9.7mm. Chè là loại cây có yêu cầu điều kiện nhiệt độ

không khí trung bình hàng năm 18-23°C và độ ẩm không khí trung bình >80%. Với điều kiện thời tiết như trên có thể thấy tuần này thời tiết tương đối thuận lợi cho cây chè phát triển. Trong tuần, cây chè chịu ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại chính: sâu cuốn lá non, sâu cuốn búp, bọ xít muỗi.... Dự báo tuần tiếp theo, nhiệt độ của khu vực cơ bản không có thay đổi nhiều so với tuần này, tuy nhiên lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm, khả năng phát sinh một số sâu bệnh hại: bọ xít bông, sâu nhóm kèn..

Cây ăn bưởi: đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch – ra lộc – nụ hoa. Điều kiện nhiệt độ thích hợp cho cây bưởi phát triển 23-29°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh so với tuần trước, trung bình khoảng 3.3°C, dao động trong khoảng 16.5-25.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 9.7mm. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cho cây bưởi phát triển. Rầy, rệp, bọ cánh mềm là các đối tượng sâu bệnh hại cây bưởi chủ yếu trong tuần. Tuần tiếp theo, dự báo lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm, chú ý tưới nước bổ sung cho cây bưởi đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.4 - 25.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.4°C, tổng lượng mưa là 4.3mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ cơ bản không thay đổi, lượng mưa có xu thế giảm. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng