



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 3 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 20.2 - 27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 53mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 52.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 17.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 9.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 01-11/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày 02/4 có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.7	20.8	25.3	0.3
Trong tuần	27.9	20.2	24.1	53.0
Tuần tới	35-38	22-26	28-31	20-40

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa Đông xuân: cây lúa trà sớm đang trong giai đoạn chín – thu hoạch, trà chính vụ đang trong giai đoạn trổ - chắc xanh, trà muộn đang trong giai đoạn đứng cái – trổ. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 20.2-27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, lượng mưa của khu vực 50.3mm. Điều kiện nhiệt tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây lúa chịu tác động của một số sâu bệnh hại chủ yếu: rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt... Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh cần lưu ý: đối với các diện tích lúa trong giai đoạn trổ chín cần tiến hành tháo hết nước trong ruộng (trong trường hợp ruộng đang có nước) trước khi thu hoạch 10-15 ngày, đối với các diện tích lúa đang trong giai đoạn đứng cái - trổ - chắc xanh đây là giai đoạn cây lúa rất cần nước, không được để ruộng khô nước, cần tưới nước luân phiên nhưng ruộng vừa cạn cần tưới lại, nên duy trì mực nước trên ruộng khoảng 5cm để lúa phát triển một cách tốt nhất. Dự báo tuần tiếp theo, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, cần chú ý diễn biến sâu bệnh hại: sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá – cổ bông...

Cây ngô Đông xuân: đang trong giai đoạn trổ cờ - thâm râu – thu hoạch. Tuần 3 tháng 3, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước (trung

binh khoảng 1.2°C) dao động khoảng 20.2-27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tuy nhiên lượng mưa của khu vực tăng mạnh (khoảng 52.7mm, lượng mưa tuần này đạt 50.3mm). Trong giai đoạn trổ cờ - thâm râu – thu hoạch, đây là giai đoạn cây ngô ngừng phát triển thân lá và chuyển toàn bộ chất dinh dưỡng hút được từ đất vào cơ quan sinh sản, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô trong thời kỳ này 22-25°C, độ ẩm đất thích hợp từ 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng. Với điều kiện thời tiết như trên có thể thấy, tuần này thời tiết của khu vực tương đối thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Lưu ý đối tượng sâu bệnh hại: sâu đục thân/bấp, sâu xanh cắn lá/râu....Tuần tới, dự báo nhiệt độ trung bình của khu vực có xu thế tăng (dao động trong khoảng 28-31°C), lượng mưa của khu vực có xu thế giảm (20-40mm), cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại có khả năng phát sinh trong thời gian tới.

Cây lạc Đông Xuân: ra hoa – đâm tia – chắc quả. Cây lạc sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 24-33°C. Lạc là loại cây có khả năng chịu hạn ở một mức độ nhất định, nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây lạc. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này khu vực Trung Trung Bộ dao động trong khoảng 20.2-27.9°C, lượng mưa của khu vực 50.3mm. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Lưu ý một số sâu bệnh hại chủ yếu trong giai đoạn này: sâu xám, bệnh lở cổ rễ...Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu trong thời gian tới: bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, sâu xám...

Cây mía: đang trong giai đoạn cây con – vươn lóng. Mía là loại cây sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 26 - 33°C và độ ẩm 75-85%. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước dao động trong khoảng từ 20.2-27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, lượng mưa của khu vực 50.3mm. Với điều kiện như trên có thể nhận thấy, thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho cây mía phát triển. Tuần này, cây mía tiếp tục chịu tác động của một số sâu bệnh hại chủ yếu: bệnh chồi cỏ, rệp sáp, bệnh trắng lá mía... Tuần tiếp theo, dự báo nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động 28-31°C, lượng mưa của khu vực dao động 20-40mm, cần chú ý: rệp sáp, bệnh trắng lá mía...phát sinh gây hại.

Cây tiêu: đang giai đoạn thu hoạch. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất từ 25 - 27°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm trong khu vực: nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ dao động 20.2-27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, lượng mưa của khu vực 50.3mm. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích tiêu đã chín, lưu ý một số sâu bệnh hại chủ yếu: tuyến trùng hại, bệnh tiêu điên...Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng trong khi lượng mưa của khu vực có xu thế giảm,

chú ý theo dõi diễn biến các sâu bệnh hại chủ yếu: bệnh thán thư, bệnh chết nhanh/chậm...

Cây điều: đang trong giai đoạn ra hoa – ra quả. Điều là loại cây ưa sáng, thích hợp sống trong điều kiện nhiệt độ trung bình khoảng 27°C và độ ẩm không khí từ 68-77%. Tuần 3 tháng 3, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước (trung bình khoảng 1.2°C) dao động trong khoảng từ 20.2-27.9°C, lượng mưa của khu vực có xu thế tăng mạnh (khoảng 52.7mm, lượng mưa trong tuần đạt 50.3mm. Điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi cho cây điều phát triển. Trong tuần, bệnh thán thư, bệnh chết nhanh/chậm tiếp tục phát sinh gây hại chủ yếu trên các diện tích điều. Dự báo, tuần tới nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng (nhiệt độ không khí trung bình dao động 28-31°C) và lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến các loại sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ không khí trung bình dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 28 - 31°C, tổng lượng mưa của khu vực dao động 20-40mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ nhu cầu nước, dinh dưỡng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng