



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 3 tháng 1 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 16.9 - 28.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 11.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 3.8$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 6.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-11/02, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 08/02 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27	15.7	21.4	3.8
Trong tuần	28.5	16.9	22.7	11.5
Tuần tới	26-29	16-19	21-24	0-10

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa Đông Xuân 2021 - 2022	Trà sớm	Đứng cái - đòng trở	Giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp để phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh của cây lúa. Từ bảng thống kê cho thấy nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm chưa phải là điều kiện thuận lợi nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần ốc bươu vàng tiếp tục lây lan theo nguồn nước và gia tăng gây hại trên lúa Đông Xuân muộn; Chuột gây hại mạnh trên giống gieo và lúa Đông xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh – đòng trở; ngoài ra, các đối tượng như bọ trĩ, ruồi đục nõn, rầy các loại hại nhẹ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
	Trà chính vụ	Đẻ nhánh - đứng cái	
	Trà muộn	Mạ - đẻ nhánh	
Ngô	Vụ Mùa 2021	Phun râu - thu hoạch	Đối với giai đoạn cây con, PTTL nhiệt độ thích hợp từ 25-28°C. Thời kỳ trổ cờ, phun râu nhiệt độ thích hợp từ 23 - 28°C. Nhiệt độ trên 30°C hạt phàn dễ chết. Độ ẩm thích hợp 75-80% độ ẩm tối đa đòng

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
	Đông xuân 2021-2022	Cây con - PTTL	ruộng. Trời lạnh, gió nhẹ, ít mưa, nắng nhẹ (mưa to làm hạt phân bị trôi). Theo thống kê nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm cho thấy nhiệt độ thấp hơn ngưỡng tốt nhất cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô. Trong tuần sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT.
Sắn	ĐX 2020 - 2021	Nuôi củ - thu hoạch	Thời kỳ cắt con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C, độ ẩm là 70-80%. Đối với giai đoạn phát triển củ sản xuất yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Yêu cầu độ ẩm đất thích hợp lúc này là 60-70%. Nếu thiếu nước ở thời kỳ này sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển vật chất về củ, làm cho năng suất củ thấp. Thống kê từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm là điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn. Trong tuần bệnh khảm lá virus gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT, bệnh phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Kom Tum.
	Hè Thu 2021	Tạo củ - thu hoạch	
	Vụ Mùa 2021	PTTL	
	ĐX 2021-2022	Mọc mầm – cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Trong tuần sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, bệnh sưng rễ, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự; ruồi đục lá, bệnh mốc sương, xoắn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên rau họ cà.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển dao động từ 24 – 35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm cho thấy điều kiện thời tiết không phải thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển khi nhiệt độ thấp hơn giới hạn thích hợp cho cây trồng. Bệnh xì mủ phát sinh gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT.
Cà phê		Chăm sóc, nuôi quả	Nhiệt độ thích hợp đối với cà phê chè từ 18– 25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển. Bệnh gỉ sắt có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bố tập trung tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh khô cành có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố tập trung tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
Hồ tiêu		Chắc quả	Nhiệt độ thích hợp cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm là điều kiện thích hợp nhất cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu. Trong tuần tuyến trùng gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bón chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; bệnh chết nhanh diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bón chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh chết chậm có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bón chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
Điều		Phát triển quả, thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp để cây điều sinh trưởng và phát triển tốt là 24 đến 28°C, lượng nước cần từ 28 – 50mm/tuần. Từ thống kê tại bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 16.9 đến 28.5°C, nhiệt độ trung bình 22.7°C và tổng lượng mưa là 11.5 mm cho thấy điều kiện thời tiết không phải thuận lợi nhất cho các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây điều trong tuần này. Trong tuần bọ xít muỗi có dấu hiệu gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bón tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai; bệnh thán thư có dấu hiệu gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bón chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 0-10mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**