



Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 19.0 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 221.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 96.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 70.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 219.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 12-22/10, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.9	23.1	25.0	318.4
Trong tuần	24.9	19.0	21.9	221.8
Tuần tới	26.0-29.0	18.0-21.0	22.0-25.0	0.0-5.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Chắc xanh – chín - thu hoạch	Tuần 1 tháng 10, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 19.0-24.9°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 221.8mm. Trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, cây lúa sinh trưởng chậm hơn. Trong tuần, lượng mưa của khu vực tương đối cao, đối với các diện tích lúa đã chín chuẩn bị cho thu hoạch cần chú ý thoát bớt nước để công tác thu hoạch lúa diễn ra thuận lợi, đối với các diện tích lúa đã cho thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch để chuẩn bị đất trồng cho vụ Đông xuân cho đảm bảo đúng theo khung lịch thời vụ. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần cần chú ý: rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá...
Cây vải		Phát triển lộc	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 21.9°C, lượng mưa đạt 221.8mm. Do khu vực có mưa tương đối lớn từ tuần trước, tuần này với lượng

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>mưa như trên, người dân cần chú ý thoát nước tại các khu vực trũng thấp xảy ra úng quanh gốc cây vải. Trong tuần này, cây vải tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc thu, giai đoạn phát triển lộc thu rất quan trọng quyết định đến sự thành công của vụ vải năm sau. Trong tuần, đối tượng sâu đo ăn lộc non, sâu đục gân lá tiếp tục phát sinh gây hại trên cây vải. Người dân chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng trên để kịp thời phun phòng trừ. Bên cạnh đó, cần chú ý bón phân hợp lý theo tình hình sinh trưởng của cây vải để giúp cây vải sinh trưởng khỏe mạnh và bật lộc đúng thời điểm.</p>
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	<p>Cây ăn quả có múi trong khu vực Đông Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực giảm đáng kể so với tuần trước, trong đó, nhiệt độ không khí trung bình tuần này 3.1°C so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 21.9°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 25.0°C), lượng mưa trong tuần này giảm 96.6mm so với tuần trước (tuần trước lượng mưa của khu vực đạt 318.4mm, lượng mưa tuần này của khu vực đạt 221.8mm). Có thể nhận thấy, trong tuần này lượng mưa của khu vực mặc dù có giảm nhưng vẫn tương đối nhiều, do đó cần chú ý những khu vực trũng thấp có khả năng xảy ra úng nước xung quanh gốc cây.</p>
Cây ngô	Hè thu	Chín - thu hoạch	<p>Do ảnh hưởng của không khí lạnh vào cuối tuần (9-10/10), tuần này khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ giảm thấp (nhiệt độ không khí thấp nhất đạt 19.0°C), trong điều kiện nhiệt độ thấp, cây ngô sinh trưởng và phát triển chậm hơn. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 211.8mm, ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm; đối với các diện tích ngô Đông mới trồng, cần chú ý thoát bớt nước cho cây ngô. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục thân, sâu đục bắp... phát sinh gây hại trên cây ngô Hè thu; sâu cuốn lá, sâu xám, sâu keo mùa thu... phát sinh gây hại chủ yếu trên ngô Đông. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên</p>
	Đông	Mới trồng – mọc mầm - cây con	

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			cây ngô (nhất là các diện tích ngô Đông) để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 221.8mm, mặc dù lượng mưa trong tuần có giảm đáng kể so với tuần trước, tuy nhiên vẫn ở mức khá nhiều. Mưa nhiều khiến cho việc thu hoạch cây rau màu trở nên khó khăn cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng của cây rau thành phẩm. Sâu tơ, sâu khoang, bọ nhậy...là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây rau màu trong tuần, trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi, khi thấy mật độ gây hại gia tăng, cần nhanh chóng phun thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm đúng thuốc – đúng liều lượng.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 19.0-24.9°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 221.8mm. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, mưa nhiều, cây sắn sinh trưởng chậm hơn. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn: bệnh khảm lá virus, sùng trắng, rệp sáp... người dân cần chú ý theo dõi và tiếp tục thu gom tiêu hủy những cây bị nhiễm bệnh.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.0-29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động trong khoảng 22.0-25.0°C, tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 0.0-5.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ giảm, lượng mưa không đáng kể. Trong tuần tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tranh thủ điều kiện thời tiết tạnh ráo, tập trung thu hoạch các diện tích cây trồng vụ Mùa 2022 có thể cho thu hoạch, sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp và vệ sinh lại đồng ruộng để chuyển sang trồng các loại cây trồng vụ Đông bảo đảm đúng theo khung lịch thời vụ; Trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa, cần chú ý bảo đảm đủ nước cho các loại cây trồng còn lại để bảo đảm cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sâu bệnh hại; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng