



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 21.2 - 27.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 8.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 7.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-03/11, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, riêng đêm nay và ngày 02/11 trời rét. Từ ngày 04-05/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 06-11/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	20.1	22.7	15.7
Trong tuần	27.6	21.2	24.4	8.4
Tuần tới	28.0-31.0	17.0-20.0	22.5-25.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Chín - thu hoạch	Đại đa số các diện tích lúa trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ hiện đã thu hoạch xong, các diện tích còn lại hiện trong giai đoạn chín – chờ thu hoạch. Trong tuần, khu vực Đồng bằng Bắc bộ gần như không có mưa (với tổng lượng mưa tuần của khu vực đạt 8.4mm) là điều kiện thuận lợi cho thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín cũng như công tác dọn dẹp vệ sinh lại ruộng đất sau thu hoạch. Do đại đa số diện tích lúa trong khu vực đã cho thu hoạch nên các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa không đáng kể.
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 21.2-27.6°C, tổng lượng mưa trong tuần đạt 8.4mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, việc thu hoạch

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>quả đã chín trên cây ăn quả có múi diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để bảo đảm cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi cũng như bảo đảm cho chất lượng quả khi thu hoạch trên các diện tích quả đang phát triển, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Trong tuần, các đối tượng: sâu đục thân, ruồi đục quả, bệnh ghẻ sọc ...tiếp tục phát sinh gây hại trên cây ăn quả múi.</p>
Cây ngô	Đông	4-8 lá – xoáy nõn	<p>Tuần 3 tháng 10, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 24.4°C, cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa trong tuần của khu vực gần như không đáng (đạt 8.4mm), khiến cho nhu cầu về nước của cây ngô không được bảo đảm nên cần được tưới bổ sung. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá, châu chấu... trong quá trình chăm sóc, cần chú theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hợp lý.</p>
Cây nhãn		Chăm sóc sau thu hoạch – lộc bánh tẻ	<p>Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 21.2-27.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 8.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá thuận lợi cho công tác dọn dẹp vệ sinh lại vườn nhãn sau thu hoạch. Trong giai đoạn này, người dân cần tiếp tục cắt tỉa bớt các cành già cỗi, cành sâu bệnh, cành tăm, cành trong tán để tạo độ thông thoáng cho tán cây cũng như hạn chế bớt sâu bệnh hại; sau khi cắt tỉa, cần tiến hành thu dọn toàn bộ cành đã cắt cũng như lá rụng và cỏ dưới gốc cây để tiến hành tiêu hủy; đồng thời kết hợp bón phân và tưới nước hợp lý để cây nhãn nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: nhện lông nhung, bọ xít, sâu đục gân lá, sâu đo ăn lộc non...cần đặc biệt chú ý.</p>
Cây chè		Phát triển búp – hái tận thu	<p>Trong tuần này, cây chè tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – hái tận thu để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đốn chè. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè, lượng mưa trong tuần của khu vực gần như không đáng kể khiến cho tốc độ phát triển búp trên cây chè bị sụt giảm, ảnh hưởng đến năng suất chè thu hoạch. Sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần: sâu đục thân, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá thối búp...</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Rau màu	Đông	Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Cây rau màu vụ Đông trong tuần tiếp tục trong các giai đoạn cây con – phát triển thân lá – thu hoạch. Nền nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 24.4°C, điều kiện nhiệt độ tương đối thuận lợi cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp (chỉ đạt 8.4mm) nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây rau màu các loại chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu tơ, sâu khoang, bọ nhậy, rệp hại... cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại, khi thấy mật độ và mức độ gây hại vượt quá mức cho phép cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun diệt trừ (lưu ý bảo đảm đúng liều lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn lại trên cây rau màu khi thu hoạch bảo đảm trong tiêu chuẩn cho phép).
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	So với tuần trước, tuần này nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần trước (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 1.7°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 8.4mm. Trong điều kiện lượng mưa thấp, cây sắn sinh trưởng và phát triển kém hơn trực tiếp gây ảnh hưởng đến năng suất củ sắn thành phẩm. Bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần cần chú ý

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 22.5-25.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng trong khu vực, tuy nhiên lượng mưa khá thấp, do đó cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho các loại cây trồng; bên cạnh đó cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng