



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TÂY NGUYÊN
Tuần 3 tháng 10 năm 2022**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 19.3 - 27.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 108.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu hướng tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 2°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu hướng tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 2.2°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu hướng giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1.9°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.





Tổng lượng mưa có xu hướng giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 26.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 34.4\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 78.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu hướng thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-11/11, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.5	19.4	22.4	135.1
Trong tuần	27.4	19.3	23.3	108.7
Tuần tới	28.0-31.0	20.0-23.0	24.0-27.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 3 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Mùa trà sớm	Chín - thu hoạch	Đối với giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp trong khoảng từ $25-30^{\circ}\text{C}$. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đồng nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ $25-32^{\circ}\text{C}$. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm phát sinh gây hại lúa. Mùa giai đoạn đẻ nhánh - đồng trỗ, mức hại phổ biến nhẹ - trung bình; Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục gây hại trên lúa. Mùa sớm giai đoạn chín - thu hoạch, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
	Mùa chính vụ	Đẻ nhánh - đồng trỗ	
	Thu Đông (Đắk Lăk)	Mạ - đẻ nhánh	
Ngô	Vụ mùa 2022	Phát triển thân lá - trỗ cờ	Trong giai đoạn cây con, PTTL nhiệt độ thích hợp cho ngô sinh trưởng và phát triển từ $25-28^{\circ}\text{C}$. Theo thống kê cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô. Trong tuần sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - Thu hoạch	Thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ săn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Thông kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn cây con. Trong tuần bệnh khám lá virus gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, bệnh phân bố chủ yếu tại Đăk Lăk, Gia Lai.
	Hè Thu 2022	PTTL - tạo củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Ruồi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đóm đen tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên rau họ cà. Bọ nhảy, bệnh sưng rễ, bệnh thối nhũn, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Sâu riêng sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24 – 35°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi nhất cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển. Bệnh xỉ mủ phát sinh gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT.
Cà phê		Chín-thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp đối với cà phê chè từ 18–25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển ở các giai đoạn này. Trong tuần bệnh gỉ sắt có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT; bệnh khô cành có diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT. Bệnh phân bố chủ yếu tại tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Lăk.
Hồ tiêu		Nuôi quả	Để cây tiêu sinh trưởng và phát triển thuận lợi, nhiệt độ thích hợp dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu ở giai đoạn này. Trong tuần tuyến trùng gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng; bệnh chét nhanh diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đăk Lăk; bệnh chét chậm có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Điều		Chăm sóc – ra đợt non	Nhiệt độ độ thích hợp để cây điều sinh trưởng và phát triển tốt là 24 đến 28°C, lượng nước cần từ 28 – 50mm/tuần. Từ thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở giai đoạn này. Trong tuần bọ xít muỗi có dấu hiệu gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT; bệnh thán thư có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT. Bệnh phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 28.0 – 31.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 20.0 – 23.0°C nhiệt độ không khí trung bình 24.0 – 27.0°C, tổng lượng mưa là 20.0 – 40.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng