



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 17.1 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.2°C, tổng lượng mưa là 0.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 14.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 21.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-14/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ 13-14/11 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 15-18/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 19-21/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác (tập trung từ đêm 19 đến sáng ngày 20/11). Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.2	17.4	22.8	15.3
Trong tuần	25.3	17.1	21.2	0.8
Tuần tới	27.0-30.0	17.0-20.0	22.0-25.0	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây vải		Phát triển lộc – lộc bánh tẻ	Bước sang tháng 11, các diện tích vải trong khu vực Đông Bắc cần chú ý các biện pháp để kìm hãm sự phát triển của lộc đông. Đây là yếu tố rất quan trọng quyết định đến năng suất của vụ vải năm sau. So với tuần trước, tuần này, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ giảm (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 1.6°C); tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này không đáng kể (đạt 0.8mm). Có thể nhận thấy, đây là điều kiện tương đối thuận lợi cho việc kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây vải. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên cây vải: sâu đo ăn lộc non, sâu đục

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			gân lá, sâu đục thân... người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phun phòng trừ khi nhận thấy mức độ gây hại vượt quá mức cho phép.
Cây ăn quả có múi		Quả xanh - quả chín - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Tuy nhiên, đối với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, trong điều kiện thiếu nước, cây sinh trưởng kém và trực tiếp ảnh hưởng đến các diện tích quả hiện đang trong giai đoạn phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới bổ sung nước cho cây ăn quả có múi để bảo đảm cho cây sinh trưởng khỏe mạnh cũng như bảo đảm cho chất lượng quả khi thu hoạch. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, ruồi đục quả, bệnh ghẻ sẹo, râm quả...
Cây ngô	Đông	Mới trồng – cây con – 8 lá – xoáy nõn – trở cờ	Trong các giai đoạn mới trồng – trở cờ, cây ngô yêu cầu bảo đảm đầy đủ nước để sinh trưởng khỏe mạnh. Từ nhiều tuần nay, khu vực Đông Bắc có lượng mưa tương đối thấp và liên tục giảm, đây là điều kiện không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ngô, nhu cầu về nước trên cây ngô được bảo đảm qua việc tưới bổ sung. Tuy nhiên, cũng vì lượng mưa trong của khu vực tương đối thấp là điều kiện giúp cho quá trình trở cờ - thụ phấn diễn ra thuận lợi, tạo tiền đề cho năng suất ngô khi thu hoạch cao. Trong các giai đoạn này, đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rệp hại... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Cây rau màu	Đông	Cây con – phát triển thân lá	Tương tự như đối với nhiều loại cây trồng khác. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rau màu trong khu vực Việt Bắc bị chi phối chủ yếu bởi yếu tố lượng mưa. Trong tuần này, lượng mưa của khu vực Đông Bắc đạt 0.8mm, lượng mưa trên không đủ đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây rau màu các loại nên rất cần được tưới thêm nước bổ sung (nhất là các loại rau họ cải). Sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, rầy mềm... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây rau màu các loại trong tuần cần chú ý theo dõi để kịp thời

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			phòng trừ (lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun diệt trừ sâu bệnh gây hại, cần chú ý bảo đảm dư lượng thuốc còn lại khi thu hoạch bảo đảm trong mức cho phép).
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Cây sắn trong khu vực Đông Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần tương đối phù hợp với sắn, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 0.8mm. Là loại cây có khả năng chịu hạn tốt nhưng nếu bảo đảm đầy đủ độ ẩm, cây sắn sẽ sinh trưởng tốt tạo tiền đề cho năng suất củ thu hoạch cao. Do đó, trong điều kiện thời tiết như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn. Trong tuần, cây sắn chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh hại: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động thu gom, tiêu hủy những cây đã bị nhiễm sâu bệnh nhằm hạn chế sự lây lan trên diện rộng của sâu bệnh hại.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0-30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0-25.0°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ cơ bản phù hợp với sinh trưởng của các loại cây trồng, tuy nhiên lượng mưa dự báo của khu vực tương đối thấp. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần chú ý: Tiếp tục thu hoạch các diện tích cây trồng đã cho thu hoạch, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh lại đồng ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng sâu bệnh hại lây lan sang vụ sau; Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, làm cỏ, bón phân cân đối và hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu trước điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sự ảnh hưởng của các đối tượng sâu bệnh hại; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng