



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 11 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 19.0 - 28.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 0.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 7.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.2$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 14.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-14/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ 13-14/11 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 15-18/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 19-21/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác (tập trung từ đêm 19 đến sáng ngày 20/11). Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.6	21.2	24.4	8.4
Trong tuần	28.4	19.0	23.7	0.5
Tuần tới	27.0-30.0	17.0-20.0	22.0-25.0	10.0-20.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Trong điều kiện thời tiết như trên, việc thu hoạch quả đã chín trên cây ăn quả có múi diễn ra thuận lợi hơn. Người dân cần tránh việc thu hoạch sau khi mưa xuống hoặc lúc có sương mù dày đặc vì rất dễ khiến trái cây bị ẩm thối. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn kết trái nhưng không chịu được ngập úng, để bảo đảm cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi cũng như bảo đảm cho chất lượng quả khi thu hoạch trên các diện tích quả đang phát triển, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Trong tuần, các đối tượng: sâu đục thân, ruồi đục quả, bệnh ghè sẹo...tiếp tục phát sinh gây hại trên cây ăn quả múi.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	4-8lá - xoáy nõn-trở cờ	Tuần 1 tháng 11, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 23.7°C, cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa trong tuần của khu vực gần như không đáng kể ( 0.5mm), khiến cho nhu cầu về nước của cây ngô không được bảo đảm nên cần được tưới bổ sung. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá, châu chấu... trong quá trình chăm sóc, cần chú theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hợp lý.
Cây nhãn		Chăm sóc sau thu hoạch – lộc bánh tẻ	Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá thuận lợi cho công tác dọn dẹp vệ sinh lại vườn nhãn sau thu hoạch. Trong giai đoạn này, người dân cần tiếp tục cắt tỉa bớt các cành già cỗi, cành sâu bệnh, cành tăm, cành trong tán để tạo độ thông thoáng cho tán cây cũng như hạn chế sâu bệnh hại; đồng thời kết hợp bón phân và tưới nước hợp lý để cây nhãn nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: nhện lông nhung, bọ xít, sâu đục gân lá, sâu đo ăn lộc non... cần đặc biệt chú ý.
Cây chè		Phát triển búp – hái tận thu	Trong tuần này, cây chè tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – hái tận thu để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đốn chè. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè, lượng mưa trong tuần của khu vực gần như không đáng kể khiến cho tốc độ phát triển búp trên cây chè bị sụt giảm, ảnh hưởng đến năng suất chè thu hoạch được. Sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần: sâu đục thân, bọ cánh tơ, bệnh phòng lá thối búp...
Rau màu	Đông	Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Cây rau màu vụ Đông trong tuần tiếp tục trong các giai đoạn cây con – phát triển thân lá – thu hoạch. Điều kiện khí tượng trong tuần tương đối thuận lợi cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp (chỉ đạt 0.5mm) nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây rau màu các loại chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, rệp hại... cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại, khi thấy mật độ và

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			mức độ gây hại vượt quá mức cho phép cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun diệt trừ (lưu ý bảo đảm đúng liều lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn lại trên cây rau màu khi thu hoạch bảo đảm trong tiêu chuẩn cho phép).
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	So với tuần trước, tuần này nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 0.7°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 0.5mm. Trong điều kiện lượng mưa thấp, cây sắn sinh trưởng và phát triển kém hơn trực tiếp gây ảnh hưởng đến năng suất củ sắn thành phẩm. Bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần cần chú ý

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp dao động trong khoảng 17.0-30.0°C, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng trong khu vực, tuy nhiên lượng mưa khá thấp, do đó cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho các loại cây trồng; bên cạnh đó cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**