



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 23.3 - 28°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 56.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 34.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 17.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 46.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/11-03/12, có mưa vài nơi, riêng đêm và sáng mai (02/12) có mưa rải rác. Trời rét đậm, vùng núi rét hại; từ ngày 03/12 Trời rét, vùng núi trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 04-11/12, có mưa vài nơi; riêng đêm 04-05/12 và từ 08-09/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.5	23.2	25.8	21.9
Trong tuần	28.0	23.3	25.6	56.2
Tuần tới	25.0-28.0	12.0-15.0	18.5-21.5	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả có múi		Chín - thu hoạch	Tuần 3 tháng 11, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 25.6°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 56.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín bảo đảm chất lượng cũng như hạn chế được sự hư hỏng trong quá trình bảo quản. Trong tuần, các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi: sâu đục thân cành, ruồi đục quả, bệnh khô cuống quả, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh... Trong thời gian tới, người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín, bên cạnh đó, cần tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế sự phát sinh của các đối tượng gây hại trên cây ăn quả có múi.
Cây	Đông	9 lá - xoáy	Hầu hết diện tích ngô trong khu vực Đồng bằng

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
ngô		nõn - trở cờ - phun râu - phát triển bắp - thu hoạch	Bắc Bộ hiện trong giai đoạn 9 lá – xoáy nõn – phát triển bắp, một số diện tích ngô nếp và ngô ngọt trồng sớm hiện đã cho thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, thời tiết của khu vực trong tuần tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm cung như thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển (lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô tại các vùng thiếu nước). Trong tuần, sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại trên nhiều vùng trồng ngô trong khu vực. Do đó, để hạn chế tối đa sự phát triển của đối tượng sâu keo mùa thu trên cây ngô, người dân cần có các biện pháp để phòng trừ: sử dụng bã chua ngọt để diệt bươm trưởng thành trước khi đẻ trứng, thường xuyên thu gom và tiêu hủy các ổ trứng trên ruộng, nơi xuất hiện sâu có mật độ cao cần sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật phù hợp phun trực tiếp vào nõn ngô để diệt sâu keo mùa thu.
Cây lạc	Đông	Phân cành – phát triển thân lá – đâm tia	So với tuần trước, tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ cơ bản không thay đổi nhiều, cây lạc sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 56.2mm, do lượng mưa trong tuần phân bố không đồng đều trên toàn khu vực nên cần lưu ý tưới bổ sung trên nước cho các khu vực trồng lạc đang bị khô. Trong tuần, các đối tượng: sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ... tiếp tục phát sinh gây hại trên cây lạc cần chú ý.
Cây nhãn		Phát triển lộc – lộc bánh tẻ	Trong tuần, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 23.3-28°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 56.2mm. Hiện nay, lộc Thu trên cây nhãn trong khu vực cơ bản đã khá thành thực và chuẩn bị bước vào giai đoạn ngủ đông. Với điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực có mưa không nhiều giúp cho quá trình hãm lộc đông trên cây nhãn diễn ra thuận lợi hơn. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tiếp tục các biện pháp: xiết nước, khoanh cành, chặt bớt phần rễ ăn nông xung quanh gốc cây nhằm hạn chế sự phát triển của lộc đông, đưa cây nhãn vào giai đoạn ngủ đông để giúp phân hóa mầm hoa hiệu quả; bên cạnh đó, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: bọ xít, sâu đục gân lá, bệnh thán thư...

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây chè		Phát triển búp – hái tận thu – chuẩn bị đón	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, so với tuần trước, trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm, lượng mưa của khu vực có xu thế tăng (lượng mưa trong tuần đạt 56.2mm). Trong điều kiện thời tiết như trên, cây sinh trưởng và phát triển chậm khiến cho năng suất chè thu hoạch được giảm sút. Cây chè chuẩn bị bước vào giai đoạn đón chè, người dân cần tập trung thu hoạch nốt các những diện tcihs chè có thể cho thu hoạch để chuẩn bị cho công tác đón chè và vệ sinh lại đồi chè sau thu hoạch. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: sâu đục thân, rầy xanh, bọ trĩ, bệnh phòng lá ...
Rau màu	Đông	Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây rau màu các loại, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 56.2mm không đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh trưởng của cây rau màu nên cần được tưới bổ sung. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại chủ yếu trên cây rau màu các loại: bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh ăn lá, sâu cuốn lá, rầy mềm, bọ phấn trắng.... Trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, bón phân hợp lý cho cây rau màu, người dân cần chú ý diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây rau màu các loại để có các biện pháp phòng trừ phù hợp.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ - thu hoạch	Nhiệt độ không khí trung bình của khu vực trong tuần đạt 25.6°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 56.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm cũng công tác dọn dẹp vệ sinh lại đồng ruộng sau thu hoạch. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn trong tuần cần chú ý: bệnh khảm lá do virus, bọ phấn trắng, sùng trắng, rệp sáp...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 12.0-28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5-21.5°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa tương đối thấp. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây trồng, riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn; Tiến hành làm cỏ, bón phân hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và

tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh hại cũng như điều kiện ngoại cảnh bất lợi;
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên các loại cây trồng và có các
biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng