



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 23.7 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27°C, tổng lượng mưa là 88.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 23.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 29.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/11 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 13-15/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 16-17/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 18-21/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 21/11 mưa giảm. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.2	23.8	26.5	111.5
Trong tuần	30.4	23.7	27.0	88.1
Tuần tới	29.0-32.0	21.0-24.0	25.0-28.0	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 1 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa vụ Mùa	Trà sớm	Chín – thu hoạch	Đối với giai đoạn đẻ nhánh, đồng trở nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh của cây lúa. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Người dân cần tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch lúa mùa trà sớm.
	Trà chính vụ	Đẻ nhánh – đồng trở - chín sấp	Trong tuần sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm phát sinh gây hại lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đồng trở, mức hại phổ biến nhẹ - trung bình; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ. Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục gây hại trên lúa Mùa sớm giai đoạn chín - thu hoạch, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Ngô	Vụ mùa 2022	3 đến 7 lá – trổ cờ - phun râu	Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Cần tiến hành tia chồi để đảm bảo chất lượng bắp thương phẩm. Trong tuần bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, sau đực thân, rầy mềm tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Trong giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp cho sắn sinh trưởng và phát triển dao động từ 20 - 27°C. Thời kỳ nuôi củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn ở các giai đoạn này. Lưu ý các đối tượng sinh vật như: bọ phấn trắng, rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ. Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan và gây hại tại các vùng trồng sắn trong khu vực.
	Hè Thu 2022	PTTL – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con – hình thành tán	
Rau màu		Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch	Xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại dưới mức nhiễm như sâu tơ, rệp muội, bệnh héo vàng trên rau cải ăn lá và rau thập tự. Bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua. Các đối tượng sinh vật hại như sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ phát sinh gây hại nhẹ.
Thanh Long		Chăm sóc - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long. Trong tuần thời đầu cành, bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh. Lưu ý cắt bỏ những cành bị nhiễm bệnh, cạo bỏ những phần thịt lá bị bệnh đem tiêu hủy hạn chế tránh lây lan.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Trong giai đoạn này, việc xử lý nấm và sâu bệnh hại sau khi thu hoạch cực kỳ quan trọng. Nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của sầu riêng. Bên cạnh đó, những vết thương do quá trình

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			thu hoạch trái cũng mở đường cho nấm khuẩn tấn công mạnh mẽ. Một số bệnh thường xuất hiện trên cây sầu riêng giai đoạn này như: bệnh thán thư, bệnh nấm hồng, bệnh thối gốc xì mù,...và côn trùng gây hại ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
Hồ tiêu		Nuôi quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua. Trong tuần bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh, nhất là trên các vườn tiêu không thoát nước tốt, bón phân không cân đối.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 29.0 – 32.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 21.0 – 24.0°C nhiệt độ không khí trung bình 25.0 – 28.0°C, tổng lượng mưa là 50.0 – 100.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng