


Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 11 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 18.8 - 27.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 23°C, tổng lượng mưa là 54.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 24.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 17.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 32.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/11-02/12, có mưa rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 03-04/12, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Từ đêm 04-11/12, có mưa vài nơi; riêng đêm 04-05/12 và từ 08-09/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.0	17.1	22.0	30.7
Trong tuần	27.2	18.8	23.0	54.9
Tuần tới	27.0-30.0	9.0-12.0	18.0-21.0	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	9 lá – xoáy nõn – trổ cờ - phun râu - phát triển bắp	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 18.8-27.2°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 54.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tạo điều kiện cho quá trình trổ cờ - thụ phấn trên cây ngô diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Trong tuần, cây ngô chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu đục thân, rệp hại ... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối

			tượng gây hại để chủ động phòng trừ kịp thời.
Cây lạc	Đông	Phân cành – phát triển thân lá – đâm tia	Trong giai đoạn ra này, nhiệt độ thích hợp cho cây lạc từ 23-33.0°C, đầy đủ độ ẩm. Nền nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 23.0°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 54.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lạc. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp nên cần chú ý tưới bổ sung thêm nước cho cây lạc. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần cần chú ý: sâu xám, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ ...
Cây khoai tây		Phân cành – phát triển thân lá	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản phá thuận lợi với sinh trưởng của cây khoai tây. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 54.9mm. Khoai tây là loại cây ưa ẩm nên nước là yếu tố rất quan trọng trong quá trình sống của cây khoai tây. Với lượng mưa của khu vực trong tuần như trên, cần chú ý tưới bổ sung thêm nước cho cây khoai tây. Trong giai đoạn này, chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây khoai tây: bệnh héo xanh vi khuẩn, rệp sáp trắng, sâu xám, sâu khoang phát sinh gây hại trên cây khoai tây.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây sắn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ, một số diện tích trồng sớm đã cho thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, trong tháng này, khu vực Tây Bắc có lượng mưa thấp, đây là điều kiện khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Do đó, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để thu hoạch

			<p>các diện tích sẵn củ đã già. Sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh lại đồng ruộng để hạn chế sự tồn tại của các đối tượng gây hại trên đồng ruộng gây ảnh hưởng đến vụ tiếp theo.</p>
<p>Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)</p>		<p>Quả xanh - quả chín – thu hoạch</p>	<p>Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, trong tuần này mặc dù lượng mưa của khu vực có tăng so với tuần trước nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu về nước của cây ăn quả có múi nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Trong tuần, nhiều diện tích quả có múi đã chín và cho thu hoạch, người dân nên chọn những ngày không mưa, thời tiết tạnh ráo để tiến hành thu hoạch các diện tích quả có múi để giúp bảo đảm chất lượng của quả thành phẩm và hạn chế sự hư hại trong quá trình bảo quản. Sâu đục quả, bệnh khô cuống quả, sâu đục thân, bệnh ghẻ sẹo ... là một số đối tượng gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần.</p>
<p>Cây nhãn</p>		<p>Phát triển lộc</p>	<p>Tuần 3 tháng 11, cây nhãn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Trong giai đoạn này, phần lớn các diện tích lộc trên cây nhãn đã thành thực. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 18.8-27.2°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 54.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá thuận lợi cho việc kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn. Trong giai đoạn này, cần tiếp tục chú ý các biện pháp để giúp hạn chế sự bật lộc đông trên cây nhãn như: khoanh cãnh, siết nước, chặt bớt các lớp rễ ăn lan xung quanh gốc...; đồng thời, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh trên cây nhãn trong giai đoạn này: sâu ăn lộc non, sâu đục thân, sâu cuốn tổ, bọ</p>

			xít nâu...
Cây chè		Ra búp – hái tận thu – đốn	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ không khí trung bình của khu vực trong tuần đạt 23.0°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 54.9mm. Cây chè hiện trong giai đoạn cuối vụ thu hoạch. Trong giai đoạn này, người dân cần tập trung thu hái toàn bộ diện tích búp chè còn lại để chuyển sang giai chăm sóc sau thu hoạch, giúp cây chè có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sau một vụ thu hoạch chè. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: sâu đục thân, bệnh phòng lá thối búp chè, rầy xanh...

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 9.0-30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.0-21.0°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng (nhất là các loại cây trồng ngắn ngày vụ Đông: ngô, lạc, khoai tây); Riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Tiếp tục bón phân hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng; Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ hợp lý.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng