



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 19.4 - 22°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 106.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 6.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 8.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 354.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 35.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 99.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/12, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Từ ngày 13-15/12, có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 16-21/12, có mưa vài nơi, trời rét. Riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 17/12 trời rét đậm. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.1	23.4	26.8	461
Trong tuần	22.0	19.4	20.7	106.8
Tuần tới	20.0 – 23.0	9.0 – 12.0	14.5 – 17.5	5.0 – 10.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Xuân sớm	Mạ	Nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là từ 25-30 độ C, thống kê nhiệt độ trong tuần tương đối thấp, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, người dân cần có biện pháp chống rét cho mạ như: che phủ nilon trong cho diện tích mạ và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo độ kín của nilon, tưới đủ nước cho cây trồng. Dự báo thời tiết tuần tiếp theo nhiệt độ tiếp tục giảm do đó cần hạn chế bón quá nhiều phân cho cây, nhất là phân đạm, NPK sẽ làm mạ bị sọt và chết cây. Để cây có khả năng phát triển khỏe khoắn nên bón lót cho mạ bằng phân chuồng hoai mục và gia đầy mạnh bón thúc phân kali để hỗ trợ cây có khả năng nâng cao khả năng chống rét cho cây mạ. Khi nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C nên dừng gieo mạ, để có thể bảo đảm được cây mạ phát triển sinh trưởng khỏe khoắn.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây mía		Tích lũy đường - chín	Mía tiếp tục trong giai đoạn tích lũy đường - chín với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 12 dao động từ 19.4 - 22°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 106.8mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cần mía gốc, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần triển khai các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa giảm so với tuần này, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 14.5-17.5°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.
Cây lạc	Đông	Phát triển quả - vào chắc	Trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều. Thời kỳ kết quả, cây đòi hỏi đầy đủ lân, can xi. Nhiệt độ cũng là điều kiện cần thiết để cho quả phát triển bình thường. Nhiệt độ giảm xuống 20°C quả ngừng phát triển. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy trong tuần nhiệt độ tương đối thấp (giao động từ 19.4 – 22.0 độ C), người dân cần chú ý tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoại mục, phân NPK tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: sâu xám, sâu cuốn lá, sâu khoang và các loại rệp.
Cây sắn		Tích lũy bột – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 19.4 - 22°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 106.8mm, cho thấy điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho sắn sinh trưởng trong các giai đoạn của tuần này. Chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Đông	Gieo – 8-9 lá – xoáy nõn – chín sũa	Trong giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô là khoảng 20 - 30°C. Cây ngô cần ít nước nhưng cần đảm bảo đủ ôxy cho rễ phát triển. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 19.4 - 22°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 106.8mm. Lưu ý tưới đủ nước cho ngô nhất là giai đoạn 8-9 lá và 2 tuần trước và

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sau trổ, đặc biệt sau khi bón phân. Chủ động các biện pháp phòng trừ sâu xám, sâu cắn lá, sâu đục thân, bệnh đốm lá, khô vằn.
Rau màu		Cây con – thu hoạch	Nhiệt độ đã có xu hướng giảm, khi tiến hành trồng cây rau màu vào vụ đông cần tìm hiểu thêm kỹ các giống rau phù hợp trồng vào vụ, có thể chịu lạnh tốt. Đối với cây con xuống ruộng cần lưu ý đến thời tiết, nên chọn các ngày nắng ấm, nhiệt độ trung bình trên 15 độ C. Sau khi tiến hành trồng cây nên tưới nước liên tục, cung ứng nước đủ ẩm để giữ nhiệt cho cây rau. Phối hợp tủ gốc cho cây bằng rơm rạ hoặc trấu gạo hoặc tro bếp. Khi cây đã ổn định nên tưới phân kali và lân cho cây để hỗ trợ cây hồi phục. Đối với các cây rau màu đang trong giai đoạn có thể thu hoạch, cần thu hoạch ngay cho cây.
Cây ăn quả		KTCB – chín – thu hoạch – chăm sóc	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 19.4 - 22°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 106.8mm. Đối với giai đoạn KTCB cần lưu ý cắt tỉa bộ khung, tán, nếu cây ra hoa, quả thì tỉa bỏ để cây tập trung dinh dưỡng tạo khung tán. Tranh thủ những ngày nắng ráo thu hoạch. Đối với những vườn đã thu hoạch xong cần cắt tỉa tất cả các cành sâu bệnh, cành chết, cành vượt, những cành quá dày, cắt tỉa bớt cành cấp 1 (nếu số cành cấp 1/cây quá dày) sao cho cây có bộ khung tán cân đối. Đối với cành thu, cắt bỏ những cành yếu, mọc quá dày.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 20.0 – 23.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 9.0 – 12.0°C nhiệt độ không khí trung bình 14.5 – 17.5°C, tổng lượng mưa là 5.0 – 10.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng