



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 91.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 5.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 14.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/12 có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 23-31/12 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh thời kỳ từ đêm 28 và ngày 29/12 có mưa rải rác. Trời rét. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.0	19.4	20.7	106.8
Trong tuần	22.7	13.8	18.2	15.6
Tuần tới	18.0-24.0	12.0-17.0	15.0-20.5	5.0-10.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Xuân sớm	Mạ, mạ 4-5 lá	Thống kê nhiệt độ trong tuần từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm, nhiệt độ tương đối thấp, trời rét, rét đậm về đêm, người dân cần có biện pháp giữ ấm cho mạ như: che phủ nilon trong cho diện tích mạ và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo độ kín của nilon, tưới đủ nước cho cây trồng. Trên cánh đồng đã thu hoạch, tiến hành vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế nguồn bệnh tồn tại trên lúa chết, tàn dư sau thu hoạch. Theo dõi chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại chính trên lúa sạ và mạ tại các tỉnh trong vùng.
Cây mía		Tích lũy đường - chín	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20 - 25 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm cho thấy điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho mía

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho mía..
Cây lạc	Đông	Phát triển quả - vào chắc	Tuần này lạc tiếp tục ở giai đoạn phát triển quả - vào chắc. Thời kỳ này lạc cần nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều. Nhiệt độ giảm xuống 20°C quả ngừng phát triển. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy trong tuần nhiệt độ tương đối thấp (giao động từ 13.8 – 22.7 độ C), người dân cần chú ý tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoại mục, phân NPK tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết khi nhiệt độ tương đối thấp, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo quy định.
Cây sắn		Tích lũy bột – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nên nhiệt tuần này dao động từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm, cho thấy điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho sản sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sắn.
Cây ngô	Đông	Gieo – phát triển thân lá – xoáy nõn – chín sữa	Đối với giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô là khoảng 20 - 30°C. Cây ngô cần ít nước nhưng cần đảm bảo đủ ôxy cho rễ phát triển. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm. Lưu ý tưới đủ nước cho ngô nhất là giai đoạn phát triển thân lá và 2 tuần trước và sau trỗ, đặc biệt sau khi bón phân. Lưu ý bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng
Rau màu		Cây con – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy điều kiện thời tiết tuần này dao động từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm, cho thấy nhiệt độ tương đối thấp, người dân cần đảm bảo các biện pháp giữ ẩm cho rau màu và cần lưu ý một số sâu

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho rau màu.
Cây ăn quả		KTCB – chín – thu hoạch – chăm sóc	Từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.8 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 15.6mm. Đối với giai đoạn KTCB cần lưu ý cắt tỉa bộ khung, tán, nếu cây ra hoa, quả thì tỉa bỏ để cây tập trung dinh dưỡng tạo khung tán. Tranh thủ những ngày nắng ráo thu hoạch. Đối với những vườn đã thu hoạch xong cần cắt tỉa tất cả các cành sâu bệnh, cành chết, cành vượt, những cành quá dày, sao cho cây có bộ khung tán cân đối.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 18.0 – 24.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 12.0 – 17.0°C nhiệt độ không khí trung bình 15.0 – 20.5°C, tổng lượng mưa là 5.0 – 10.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng