


Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 14.4 - 19.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.1°C, tổng lượng mưa là 7.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 2.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 14.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 31/12/2022-10/01/2023, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng các ngày 04-05/01 trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.5	12.5	17.5	0.5
Trong tuần	19.9	14.4	17.1	7.8
Tuần tới	17.0-20.0	14.0-17.0	15.5-18.5	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả có múi		Chín - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực có xu thế tăng nhẹ so với tuần trước (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 1.0°C), tổng lượng mưa trong tuần của khu vực 7.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng thấp khiến cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển kém, nên cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ăn quả có múi, bên cạnh đó để tăng khả năng chống rét cho cây có thể sử dụng chất tăng trưởng để phun cho cây.
Lúa	Chiêm xuân	Mạ, 1-3 lá	Tuần 3 tháng 12, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối thấp, với nhiệt độ không khí thấp nhất đạt 14.4°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 7.8mm. Trong điều kiện thời

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			tiết khô hanh và nhiệt độ ngoài trời giảm thấp, cây mạ sinh trưởng và phát triển kém nên cần có các biện pháp để chống rét cho cây mạ (dùng nilong làm khung vòm cho mạ, sử dụng tro bếp để phủ lên trên luống mạ, những ngày nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 13.0°C thì không tiến hành gieo mạ), bảo đảm tưới đủ ẩm đồng thời chú ý các đối tượng gây hại trên cây lúa trong thời kỳ này: ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng hại rễ ... để kịp thời có các biện pháp phòng trừ phù hợp.
Cây ngô	Đông	Thâm râu - thu hoạch	Trong tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa tương đối thấp, đây là điều kiện khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm, người dân cần tranh thủ thời tiết tốt để tiến hành thu hoạch các diện tích bắp ngô đã già. Sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh lại đồng ruộng, tiến hành làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ Xuân 2023. Trong giai đoạn này, cây ngô chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá ...
Cây lạc	Đông	Chắc củ - thu hoạch	Tương tự như đối với cây ngô, thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già nên người dân cần tranh thủ thời tiết tốt để tập trung thu hoạch các diện tích lạc củ có thể cho thu hoạch; đồng thời sau thu hoạch cần tiến hành thu gom toàn bộ phế phẩm của cây lạc cũng như cỏ cũ còn sót lại trong ruộng để tiêu hủy nhằm hạn chế tối đa tồn dư của các đối tượng sâu bệnh sang vụ tiếp theo. Trong tuần, do phần nhiều các diện tích lạc đã cho thu hoạch nên các đối tượng gây hại trên cây lạc không đáng kể.
Cây nhãn		Phát triển lộc	Tuần 3 tháng 12, cây nhãn trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 14.4-19.9°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 7.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tiếp tục thuận lợi cho kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn. Mặc dù thời tiết trong tuần và nhiều tuần nay liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc hãm lộc đông trên cây nhãn, tuy nhiên người dân vẫn cần thăm vườn thường xuyên, kịp thời phát hiện các mầm đông mọc sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Trong giai đoạn phát triển lộc, cần chú ý các đối tượng: sâu đục gân lá,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sâu đục thân, bệnh thán thư, nhện lông nhung ... khi phát hiện mật độ gây hại vượt quá mức cho phép cần nhanh chóng phun thuốc để diệt trừ kịp thời.
Cây chè		Đón cành	Các diện tích chè trong khu vực đã chuyển sang giai đoạn đón cành, việc đón cành ở cây chè có ý nghĩa rất quan trọng, đón cành giúp cây chè luôn trong trạng thái sinh trưởng, hạn chế sự ra hoa kết quả trên cây chè còn giúp cây chè; loại trừ các cành già yếu, sâu bệnh không còn khả năng phát sinh và nuôi dưỡng những cành búp tươi; tăng đường kính tán chè, tăng mật độ cành và búp trên tán tạo cơ sở cho sản lượng búp cao. Trong giai đoạn đón, cần căn cứ vào quá trình phát dục và sinh trưởng của cây chè để lựa chọn phương pháp đón cành phù hợp. Trong tuần, thời tiết của khu vực cơ bản phù hợp với công tác đón chè. Trong giai đoạn này, cần lưu ý một số đối tượng: sâu đục thân cành, bọ xít muỗi ...
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống nước ta khiến cho nền nhiệt độ của khu vực luôn ở mức thấp từ nhiều tuần nay. Cùng với đó, lượng mưa trong khu vực trong các tuần gần đây luôn ở mức thấp, thậm chí là không có mưa. Trong tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 17.1°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 7.8mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, cần khẩn trương thu hoạch các diện tích rau có thể cho thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại do giá rét gây ra; đối với các diện tích rau màu đang trong giai đoạn phát triển cần chú ý tưới đủ ẩm, bảo đảm dinh dưỡng và chú ý chống rét cho cây trong những ngày nhiệt độ ngoài trời giảm thấp. Sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh ăn lá, bệnh thối đen ... là một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây rau mà trong tuần cần chú ý.
Cây sắn		Thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm cũng như công tác dọn dẹp vệ sinh lại đồng ruộng sau thu hoạch. Trong giai đoạn này, người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch cây sắn nhằm giải phóng ruộng

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			đất để chuẩn bị gieo trồng vụ tới. Sau thu hoạch, cần nhanh chóng dọn dẹp và vệ sinh lại đồng ruộng, tiến hành thu gom và tiêu hủy toàn bộ phế phẩm còn lại của cây sắn cũng như cỏ cũ còn lại trong ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại sang vụ tiếp theo.

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 14.0-20.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa là 10.0-30.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tiếp tục có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Chủ động nguồn nước để tưới cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng (sử dụng nilong che phủ trên mặt ruộng, dùng rơm rạ, cỏ khô, tro bếp ... để ủ xung quanh gốc cây nhằm giữ ấm cho cây); Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống thấp dưới 13.0°C không tiến hành gieo cấy lúa; Tăng cường lượng phân bón hợp lý (chú trọng phân lân và kali) để giúp cây tăng khả năng chống chịu trước điều kiện thời tiết lạnh giá; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên các loại cây trồng và có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng