


Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 21.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 25.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 4.2 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 01/01/2023, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận phía có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 02-11/01/2023, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng từ chiều tối và đêm 04-07/01 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 26.0 | 22.8 | 24.4 | 55.3 |
| Trong tuần | 27.3 | 17.8 | 22.5 | 63.3 |
| Tuần tới | 24.0-27.0 | 21.0-24.0 | 22.5-25.5 | 25.0-50.0 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Khuyến cáo/Lưu ý |
|-----------|------------------------|------------------------------|---|
| Lúa | Mùa trà chính vụ | Chắc xanh - chín – thu hoạch | Tổng hợp các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm. Trong tuần do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm và sáng trời rét đã gây ảnh hưởng đến quá trình xuống giống lúa Đông Xuân. Lưu ý sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông ở giai đoạn ngậm sữa – chín; mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; chuột, ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên các trà lúa, hại nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh rõ. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống và tránh để lây lan diện rộng; diệt chuột và thu lượm ốc bươu vàng liên tục bằng nhiều biện pháp. |
| | Đông Xuân trà sớm | Mạ - đẻ nhánh | |
| | Đông Xuân trà chính vụ | Xuống giống – mạ | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------------------------------|---|
| Ngô | Vụ mùa 2022 | PTTL – trổ cờ - phun râu | Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm; tổng lượng mưa trong tuần không cao, người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho ngô, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng. |
| | Đông xuân 2022 - 2023 | Cây con – phát triển thân lá | |
| Sắn | ĐX 2021-2022 | Thu hoạch | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm, cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý bệnh thối củ sắn, rệp sáp có dấu hiệu phát sinh gây lại, người dân cần chủ động thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả. |
| | Hè Thu 2022 | PTTL – củ non – thu hoạch | |
| | Mùa 2022 | PTTL | |
| Rau màu | | Nhiều giai đoạn | Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết trong tuần tương đối phù hợp cho các loại rau màu sinh trưởng và phát triển, cần lưu ý một số sâu bệnh như bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời sử dụng các loại thuốc trừ sâu phù hợp và theo tiêu chuẩn cho phép. Thường xuyên vun đất, đắp chân để cây được cứng cáp, không bị ảnh hưởng của mưa gió. |
| Thanh Long | | Chăm sóc - thu hoạch | Đối với những vườn cây đang chăm sóc cần phải đảm bảo đủ nước cho Thanh Long. Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực thống kê tại bảng 1 cho thấy tổng lượng mưa tương đối thấp, người dân cần bổ sung thêm nước cho cây trồng và lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện bệnh cần nhanh chóng khoanh vùng xử lý, tránh tình trạng lây lan diện rộng, những thân cành bị hư hại quá nhiều cần cắt bỏ và tiêu hủy. |
| Sầu riêng | | Chăm sóc | Tùy vào giai đoạn phát triển của cây, thời tiết và nhu cầu cấp nước ở nơi trồng để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới phù hợp. Theo thống kê tại bảng 1 nhiệt dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm, cho thấy tổng lượng mưa tương đối thấp; người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho cây trồng, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: bệnh thán thư, rệp sáp, bệnh nấm hồng...khi phát hiện cần khoanh vùng tránh để lây lan diện |

| | | | |
|---------|--|---------------------------------------|--|
| | | | rộng và sử dụng biện pháp phòng trừ hiệu quả. |
| Hồ tiêu | | Nuôi quả - chắc quả - Thu hoạch | Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm. Trong tuần cây tiêu sinh trưởng và phát triển bình thường; cần tưới nước đầy đủ cho cây phát triển, lưu ý một số sâu bệnh như: cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép. |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 24.0 – 27.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 21.0 – 24.0°C nhiệt độ không khí trung bình 22.5 – 25.5°C, tổng lượng mưa là 25.0 – 50.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng