



Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 16.7 - 21.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.2°C, tổng lượng mưa là 33.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 11.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 21.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 10.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 28.0mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/12, có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 13-16/12 trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.2	18.8	23.0	54.9
Trong tuần	21.6	16.7	19.2	33.0
Tuần tới	21.0-24.0	4.0-7.0	12.5-15.5	3.0-7.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	Xoáy nõn – trở cờ - phun râu - phát triển bắp	Tuần 1 tháng 12, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 19.2°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 33.0mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh và mưa không đáng kể, quá trình sinh trưởng của cây ngô bị ảnh hưởng khiến cho quá trình vận chuyển vật chất vào tạo hạt diễn ra chậm gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như thời gian để thu hoạch bắp ngô thành phẩm. Để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng tốt hơn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, người dân cần chú ý chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô, trong khi tưới nên kết hợp bón thêm phân để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu trước điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Trong tuần, các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp hại, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi chặt

			chế diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ phù hợp.
Cây lạc	Đông	Ra hoa – đâm tia – tạo củ	Cây lạc trong khu vực Tây Bắc hiện đang trong giai đoạn ra hoa – đâm tia – tạo củ. Trong giai đoạn này, nhiệt độ tối thích và bảo đảm đủ ẩm là hai yếu tố rất quan trọng đối với sinh trưởng của cây lạc. Trong tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực giảm thấp (nhiệt độ không khí thấp nhất đạt 16.7°C, nhiệt độ không khí cao nhất đạt 21.6°C), tổng lượng mưa trong tuần đạt 33.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần khá thấp khiến cho số lượng hoa lạc giảm sút đồng thời ảnh hưởng đến số lượng tia hình thành củ trên cây lạc; cùng với đó là lượng mưa trong tuần tương đối thấp không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lạc khiến cho cây lạc sinh trưởng và phát triển kém. Vì vậy, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết không đủ đáp ứng (khi tưới nên kết hợp bón phân bổ sung cho cây). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ ...
Cây cà chua		Ra hoa – phát triển quả - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần tương đối thấp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích cà chua đã chín. Tuy nhiên, đối với các diện tích cà chua đang ra hoa – phát triển quả thì đây là thời kỳ cây cà chua cần nhiều nước nhất nên đất phải luôn được bảo đảm đủ ẩm, việc thiếu nước trong thời kỳ này sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây cà chua. Với điều kiện lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 33.0mm, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm yêu cầu về độ ẩm cho cây cà chua. Rầy mềm, rầy phấn trắng, sâu xanh đục quả, bệnh mốc đen ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cà chua trong tuần cần chú ý theo dõi, thu gom và tiêu hủy để hạn chế sự lây lan trên diện rộng của các đối tượng.
Cây sắn		Phát triển củ - thu hoạch	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 16.7-21.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 33.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm.

			Người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích sản củ đã đạt thành phẩm đồng thời tiến hành dọn dẹp vệ sinh lại ruộng sản sau thu hoạch để nhằm hạn chế tối đa tồn dư của các đối tượng gây hại trên đồng ruộng. Trong tuần, đối tượng bệnh khảm lá sản do virus tiếp tục là đối tượng gây hại chủ đạo trên cây sản.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả chín – thu hoạch	Cây ăn quả có múi trong khu vực Tây Bắc trong tuần này trong các giai đoạn quả chín – thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Trong điều kiện thời tiết tốt, người dân cần tập trung để thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch (lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng). Sâu đục quả, bướm trích hút, bệnh ghẻ sẹo ... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần.
Cây nhãn		Phát triển lộc	Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc trong tuần này có xu thế giảm mạnh so với tuần trước, với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 3.8°C; tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 33.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực thuận lợi cho việc kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn. Trong quá trình chăm sóc, người dân vẫn cần theo dõi sát sao vườn nhãn, thường xuyên thăm vườn và kiểm tra nhằm phát hiện những lộc đông xuất hiện để tiến hành ngắt bỏ kịp thời. Trong giai đoạn này, các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn cần chú ý: sâu đục gân lá, sâu đục thân/cành, bọ xít, bệnh thán thư, bệnh sương mai
Cây chè		Hái tận thu – đốn	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 16.7-21.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 33.0mm. Phần lớn các diện tích chè trong khu vực Tây Bắc hiện đã chuyển sang giai đoạn đốn. Trong giai đoạn này, cần căn cứ vào tình hình cụ thể của từng nương chè để lựa chọn biện pháp đốn chè phù hợp, đưa cây chè vào trạng thái nghỉ ngơi sau một vụ thu hoạch chè. Sau khi đốn chè phải tiến

			hành vệ sinh nương chè kịp thời, triệt để (thu gom tàn dư thân, cành, lá đem đốt hoặc tiêu hủy) kết hợp diệt trừ cỏ dại; đồng thời sau khi đốn chè từ 15-20 ngày cần tiến hành phun thuốc để phòng trừ các đối tượng gây hại trên cây chè và kích thích cây chè sinh trưởng và phát triển mạnh.
--	--	--	---

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 4.0-24.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.5-15.5°C, tổng lượng mưa là 3.0-7.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa dự báo không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng (nhất là các loại cây trồng ngắn ngày vụ Đông: ngô, lạc, khoai tây), riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Tiếp tục bón phân hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng; Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng trong điều kiện thời tiết lạnh và rét; Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ hợp lý.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng