



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 11 - 18.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.8°C, tổng lượng mưa là 1.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 31.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 18.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-27/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 28-31/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng đêm 28 và ngày 29/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.6	16.7	19.2	33.0
Trong tuần	18.7	11.0	14.8	1.1
Tuần tới	21.0-24.0	12.0-15.0	16.5-19.5	15.0-25.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	Xoáy nõn – trở cờ - phát triển bắp – chín sữa	Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến cho nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tiếp tục giảm, với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 4.4°C (nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 14.8°C), tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này không đáng kể (tổng lượng mưa tuần đạt 1.1mm). Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển, gây ảnh hưởng đến quá trình tạo hạt và tích lũy vật chất vào làm hạt từ đó gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của bắp ngô thành phẩm. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý tưới thêm nước để bảo đảm đủ ẩm cho cây ngô, ngoài ra, trong điều kiện thời tiết rét hại cần chú ý bón phân (chú trọng lượng lân và kali, giảm lượng phân đạm) để giúp cây ngô tăng khả năng chống rét. Các

			đôi tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: sâu đục bắp, sâu đục thân, rệp hại, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn ...
Cây lạc	Đông	Đâm tia – tạo củ - chắc củ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 11.0-18.7°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 1.1mm. Trong điều kiện thời tiết rét hại và gần như không có mưa, cây lạc sinh trưởng kém, ảnh hưởng đến quá trình đâm tia, tia hình thành củ và tích lũy vật chất để tạo củ. Trong tuần, cây lạc chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu xám, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, gỉ sắt ... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý bảo đảm đủ nước để tưới bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết không có mưa, ngoài ra chủ động các biện pháp để chống rét cho cây lạc trong điều kiện thời tiết rét đậm rét hại có khả năng kéo dài trong thời gian tới.
Cây cà chua		Ra hoa – phát triển quả - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho cây cà chua dao động từ 21.0-24.0°C. Trong giai đoạn ra hoa – đậu quả, cây cà chua đòi hỏi nhiều nước nhất, nếu đất quá khô thì hoa và quả non sẽ bị rụng. Tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 14.8°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 1.1mm, điều kiện nhiệt độ thấp và gần như không có mưa khiến cho cây cà chua sinh trưởng kém khiến cho số lượng hoa và quả cà chua sụt giảm đáng kể. Trong điều kiện thời tiết như trên, để hạn chế tác động của thời tiết khắc nghiệt đến sinh trưởng của cây cà chua, người dân cần chú ý: chủ động tưới thêm nước để bảo đảm đủ ẩm cho cây cà chua, tiến hành tia bớt cành lá – quả để làm bộ tán thông thoáng hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp cho cây cà chua giảm bớt gánh nặng nuôi cây để tập trung nuôi quả, tạo cho quả lớn đều cỡ và đạt chất lượng tốt. Các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cà chua trong tuần cần chú ý: bệnh héo xanh, bệnh đốm lá, bệnh đốm quả, bệnh phân trắng ...
Cây sắn		Phát triển củ - thu hoạch	Tuần 2 tháng 12, khu vực Tây Bắc gần như không có mưa tạo điều kiện cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm bảo đảm chất lượng tốt nên người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích sắn có thể cho thu hoạch. Sau thu

			hoạch, nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh lại ruộng đất nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây sắn lây lan sang vụ tiếp theo. Trong tuần, cây sắn tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, sùng trắng ...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả chín – thu hoạch	Tương tự như với tuần trước, tuần này khu vực Tây Bắc có thời tiết chủ đạo là rét và gần như không có mưa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Tuy nhiên, cũng do rét và gần như không có mưa đã khiến cho quá trình sinh trưởng của cây ăn quả có múi bị ảnh hưởng. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Các đối tượng: sâu đục quả, bươm trích hút, bệnh ghẻ sẹo ... tiếp tục phát sinh gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần.
Cây nhãn		Phát triển lộc	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 11.0-18.7°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 1.1mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tiếp tục thuận lợi cho việc kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn. Trong quá trình chăm sóc, cần thường xuyên kiểm tra vườn nhãn để kịp thời phát hiện những mầm đông mọc sớm để kịp thời có các biện pháp xử lý phù hợp. Trong giai đoạn phát triển lộc, cần lưu ý các đối tượng: bọ xít, bệnh khô cành, bệnh thán thư, bệnh chổi rồng ... phát sinh gây hại trên cây nhãn.
Cây chè		Đốn cành	Cây chè trong khu vực Tây Bắc hiện đã chuyển sang giai đoạn đốn cành. Thời tiết của khu vực trong tuần này chủ đạo là rét và gần như không có mưa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đốn và vệ sinh lại nương chè sau khi thu hoạch. Trong giai đoạn đốn, cần căn cứ vào tình hình sinh trưởng của từng diện tích chè để lựa chọn phương pháp đốn chè phù hợp. Sau đốn, cần thu dọn hết cành, nhánh chè, lá chè rụng dưới gốc để tiến hành đốt bỏ hoặc làm phân xanh để bón cho cây; tiến hành xới xáo, làm cỏ, bón phân đồng thời phun 1 lượt thuốc trừ sâu nhằm tiêu diệt và hạn chế sâu bệnh gây hại. Để giữ ẩm cho cây chè trong

			những ngày trời chuyển rét, người dân có thể sử dụng rơm, rạ, cỏ khô ... để phủ kín giữa các hàng chè sau vừa để giữ ẩm cho đất hạn chế sự bốc thoát hơi nước vừa giúp giữ ẩm cho cây chè, đồng thời hạn chế sự phát triển của cỏ dại.
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 12.0-24.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.5-19.5°C, tổng lượng mưa là 15.0-25.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa dự báo không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tiến hành cày bừa, dọn dẹp vệ sinh lại ruộng đất để chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2022-2023; Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng (nhất là các loại cây trồng ngắn ngày vụ Đông: ngô, lạc, khoai tây), riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Tiếp tục bón phân hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng; Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng trong điều kiện thời tiết lạnh và rét; Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ hợp lý.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng