



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 2 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 8.8 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.3°C, tổng lượng mưa là 21.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 19.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 4.2$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 23.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-14/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sang ngày 13/02 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 13/02, trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 15 đến ngày 20/02, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng thời kỳ ngày 17-18/02 trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét, riêng ngày 17-18/2 đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.3	11.2	13.7	40.7
Trong tuần	13.8	8.8	11.3	21.4
Tuần tới	21.0-24.0	10.0-13.0	15.5-18.5	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Lúa cấy	Hồi xanh - đẻ nhánh	Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C; thống kê số liệu trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 8.8 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.3°C, tổng lượng mưa là 21.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp.
Vải		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động trong khoảng từ 8.8 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.3°C, tổng lượng mưa là 21.4mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, nhện lông nhung; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc theo tiêu chuẩn.

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
Cây ăn quả		Thu hoạch	Số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 8.8 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.3°C, tổng lượng mưa là 21.4mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và theo tiêu chuẩn cho phép.
Ngô	Xuân	Gieo - 2 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-30 độ C, thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 11.3 độ C cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động trong khoảng từ 8.8 - 13.8°C, tổng lượng mưa là 21.4mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây khoai tây		Phát triển củ - thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 10.0-13.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ghẻ củ, sương mai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp phòng chống sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc tiếp tục có nền nhiệt thấp, bên cạnh việc sử dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả thì cần áp dụng biện pháp chống rét cho cây trồng như: phủ lên mặt luống mạ một lớp tro trấu hoặc rơm rạ để giúp mặt luống được giữ ấm; luôn giữ ẩm cho luống mạ, không nên để luống mạ khô hạn.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**