



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 10.8 - 15.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.9°C, tổng lượng mưa là 95.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 59.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 21.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 85.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.7\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/02, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; từ ngày 27/02 sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét; riêng 24/02, trời rét đậm. Từ ngày 01-03/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	15.3	10.5	12.9	36.3
Trong tuần	15.1	10.8	12.9	95.7
Tuần tới	23.0-26.0	5.0-8.0	14.0-17.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Cây – bén rễ, hồi xanh - đẻ nhánh	Nền nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực không thay đổi so với tuần trước với mức nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 10.8-15.1 $^{\circ}\text{C}$, lượng mưa tuần này tăng đáng kể (95.7mm, tăng 59.4mm so với tuần trước). Trong nửa đầu tuần, thời tiết chủ đạo của khu vực là lạnh và không mưa khiến gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây lúa. Nửa sau tuần, khu vực Việt Bắc có mưa nhiều ngày bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây lúa, tuy nhiên với nền nhiệt độ giảm sâu tới mức rét hại khiến cho cây lúa sinh trưởng kém. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý các biện pháp giúp giữ ấm cho cây lúa: dùng tro rắc trên mặt ruộng, bón phân Lân và Kali giúp cây lúa tăng khả năng chống chịu với thời

			tiết cũng như giúp cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh (để nhánh khỏe và tăng nhánh hữu hiệu trên cây lúa bước vào thời kỳ đẻ nhánh). Sâu bệnh gây hại cây lúa trong tuần: sâu đục thân cú mèo, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, chuột...
Cây ngô	Xuân 2022	Cây con – phát triển thân lá	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 12.9°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 95.7mm. Trong giai đoạn này, cây ngô chịu hạn và chịu rét khỏe hơn các giai đoạn khác trong chu kỳ sinh trưởng, tuy nhiên với mức nhiệt độ trong tuần xuống thấp như trên vẫn là điều không thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Lưu ý: không tiến hành gieo trồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C, tiến hành bón thúc giúp cho cây ngô sinh trưởng tốt cũng như tăng khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi các đối tượng: sâu xám, bệnh chết héo cây con...
Cây lạc	Xuân 2022	Mới trồng – mọc mầm	Trong tuần này, khu vực Việt Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực tương đối thấp. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 95.7mm, tập chung chủ yếu vào nửa cuối tuần khiến cho nửa đầu tuần thời tiết khu vực chủ đạo là lạnh và khô gây ảnh hưởng đến quá trình mọc mầm ở cây lạc. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: bệnh héo cây con, sâu xám, sâu khoang...
Cây ăn quả có múi (cam, bưởi)		Thu hoạch – phát triển lộc, ra hoa	Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần cơ bản không thuận lợi cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Sau một vụ nuôi trái, cây gần như kiệt quệ nên sau khi thu hoạch; do đó cần nhanh chóng giúp cây phục hồi bằng cách bón phân sau khi tia cành tạo tán. Mặt khác, cũng như cành lá, sau một thời gian bộ rễ của cây cũng bị già đi, thương tổn và cần có những tác động để kích thích bộ rễ phát triển mới giúp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng khỏe cũng như tạo tiền đề cho việc

			phát lộc và ra hoa. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân/cành, bệnh vàng lá thối rễ...
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Cây vải ra hoa thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 18-24°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 10.8-15.1°C là điều kiện không thuận lợi cho cây vải phát hoa. Trong giai đoạn này, cần chú ý khi chiều dài của hoa từ 4 - 6 cm có thể khoan nhẹ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoa, hạn chế hiện tượng ra hoa kẹp lộc. Cùng đó, người dân nên thực hiện kết hợp biện pháp tia tất cả cành tăm, cành sâu bệnh, cành dày xít, cành trong tán... để các cành hoa chính phát triển tốt, giảm sự trú ngụ của sâu bệnh và tạo điều kiện cho việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh sau này thuận tiện hơn. Trong tuần, cây vải chịu tác động bởi các đối tượng: bọ xít nâu, nhện lông nhung...
Cây chè		Đốn – chăm sóc – phát triển búp	Tuần 2 tháng 2, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 12.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 95.7mm. Trong tuần này, các diện tích chè tiếp tục trong giai đoạn đốn – chăm sóc, một số diện tích đã chuyển sang giai đoạn phát triển búp. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, cây chè sinh trưởng chậm gây ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển búp ở cây chè. Cần lưu ý: tiếp tục công tác đốn thân, tia cành, dọn dẹp vệ sinh lại nương chè; phun thuốc tiêu trừ mầm bệnh còn sót lại trên cây chè kết hợp với tưới nước và bón phân để giúp cây chè nhanh chóng phục hồi và phát triển búp. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè trong tuần cần chú ý: sâu đục thân, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 5.0 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.0-17.0°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm. Do đó, có thể nhận thấy trong tuần tiếp theo khu vực Việt Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Các cây trồng cần được chú ý: Bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng, chủ động các biện pháp giúp cây trồng chống chịu với thời tiết rét đậm rét hại và có các biện pháp phòng chống sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Riêng đối cây lúa đã cấy: khi thời tiết nắng ấm, cần tiến hành tia dặm để đảm bảo mật độ

đồng thời bón thúc để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao (lưu ý: ngừng gieo cấy và bón phân Đạm khi nhiệt độ xuống dưới 15°C); chú ý bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa theo từng giai đoạn; theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá để kịp thời phòng chống (thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng và chỉ tiến hành phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ).

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng