



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 3 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 19.5 - 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.8°C, tổng lượng mưa là 11.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 13mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 3.8$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 83.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 8.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/3, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày 24/3 có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22-23/3 trời rét. Từ đêm 24-26/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 26/3-01/4, có mưa rào và dông rải rác tập trung từ đêm 26-27/3, sau có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 27/3-01/4 đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.9	15.5	20.2	24.7
Trong tuần	28.1	19.5	23.8	11.7
Tuần tới	31.0-34.0	17.0-20.0	24.0-27.0	70.0-120.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Hồi xanh - đẻ nhánh - đứng cái	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 3.6°C), thời tiết ấm lên là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực rất thấp (chỉ đạt 11.7mm) do đó không thể đáp ứng nhu cầu của cây lúa trong các giai đoạn này. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lúa bảo đảm điều tiết hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Ngoài ra, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa: sâu đục thân, bệnh đạo ôn, dòi đục nõn...
Cây ngô	Xuân 2022	3-5 lá – xoáy nõn	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 19.5-28.1°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt

			11.7mm. Lượng mưa trong tuần thấp là điều kiện không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Do đó, để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng thuận lợi, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Trong quá trình tưới cần kết hợp bón thêm phân Đạm và Kali (cân đối liều lượng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây). Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh gây hại: sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá...
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – phát triển thân lá	Cây lạc trong khu vực Tây Bắc đang trong các giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Ở các giai đoạn này, cây lạc đòi hỏi đủ ẩm và đầy đủ dinh dưỡng để phát triển bộ rễ cũng như cơ quan sinh dưỡng. Trong tuần, khu vực Tây Bắc có lượng mưa đạt 11.7mm, điều kiện như trên không bảo đảm cho sinh trưởng của cây lạc. Sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ... Người dân cần chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại và kịp thời phòng trừ; ngoài ra cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc để bảo đảm cho cây lạc sinh trưởng tốt nhất.
Cây khoai tây		Đâm tia – phát triển củ	Là loại cây ưa ẩm, do đó cây khoai tây cần rất nhiều nước, việc thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển củ gây ảnh hưởng tới năng suất củ thu hoạch được. Tuần 2 tháng 3, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm so với tuần trước. Trong điều kiện lượng mưa thấp, để bảo đảm cho cây khoai tây sinh trưởng tốt, bảo đảm năng suất cũng như chất lượng củ, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Bệnh virus xoắn lùn, virus cuốn lá, bệnh héo xanh... là một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây khoai tây trong tuần cần chú ý.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển lộc – ra hoa	Nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 23.8°C, điều kiện nhiệt độ tương đối thuận lợi cho cây ăn quả có múi ra hoa. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 11.7mm (rất thấp), cần chú ý tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây ăn quả có múi. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, bệnh thán thư, rầy mềm...
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc – hoa. Trong

			giai đoạn này, cây nhãn cần nhiều nước. Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực khá thuận lợi cho cây nhãn phát triển, tuy nhiên lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp. Do đó, cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây nhãn. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn trong thời kỳ này (nhất là đối tượng bọ xít nâu) để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Tuần này, khu vực Tây Bắc có lượng mưa rất thấp gây ảnh hưởng không tốt tới sinh trưởng của cây chè. Sâu bệnh gây hại trên cây chè trong tuần: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý chủ động nướn nước để tưới bổ sung cho cây chè. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết ẩm lên, lưu ý kết hợp tưới nước và bón phân để giúp cây chè tăng khả năng sinh trưởng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.7.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.0-27.0°C, tổng lượng mưa là 70.0-120.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng. Một số lưu ý đối với cây trồng trong tuần tới: tranh thủ thời tiết ẩm lên, người dân cần bón thúc đủ, kịp thời, bón tập trung để cây lúa sinh trưởng - phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao. Căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế để điều tiết nước trong ruộng sao cho đảm bảo nhu cầu theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Tăng cường thăm đồng, kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động phòng chống kịp thời (chú ý bệnh đạo ôn, ngệt rầy, sâu đục thân, ruồi đục lá, chuột,... hại lúa). Đối với cây ngô, lạc... chú ý xới xáo, làm cỏ, bón phân thúc hợp lý để giúp cây sinh trưởng tốt. Các cây trồng còn lại, cần chú ý bảo đảm nhu cầu về nước cũng như dinh dưỡng, đồng thời có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**