



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
Tuần 2 tháng 3 năm 2022**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 21.6 - 29.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 6.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 13mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 2.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 23.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/3, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc chiều tối và đêm nay 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 25-26/3, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 26/3-01/4, có mưa rào và dông và dông rải rác từ đêm 26-28/3, sau có mưa vài nơi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.6	20.7	23.7	19.4
Trong tuần	29.9	21.6	25.7	6.4
Tuần tới	31.0-34.0	20.0-23.0	25.5-28.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng - trổ	Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng nhẹ (trung bình đạt 25.7°C, tăng 2.0°C so với tuần trước). Có thể nhận thấy, nhiệt độ trong tuần này của khu vực khá thuận lợi cho sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần này rất ít. Đây là điều kiện rất bất lợi cho cây lúa (nhất là cây lúa đang làm đòng - trổ), việc thiếu nước trong thời kỳ này sẽ khiến cho cây lúa bị nghẽn đòng không thoát ra được. Do đó, trong quá trình chăm sóc, người dân đặc biệt lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa theo nhu cầu theo từng giai đoạn. Một số đối tượng sâu bệnh gây

			hại trên cây lúa trong tuần cần chú ý: bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, dòi đục nõn...
Cây ngô	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá - trổ cờ - thâm râu	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 21.6-29.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 6.4mm. Nhiệt độ và lượng mưa trong tuần thuận lợi cho quá trình thụ phấn ở cây ngô. Tuy nhiên, lượng mưa thấp lại là gây cản trở lớn đến sinh trưởng của cây ngô. Vì vậy, để đảm bảo cho cây ngô sinh trưởng tốt, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Đồng thời, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu xám, sâu đục thân, rệp hại cờ... để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Cây lạc	Đông xuân (2021-2022)	Ra hoa – quả non	Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có lượng mưa giảm mạnh. Trong thời kỳ ra hoa, cây lạc rất cần nước, việc thiếu nước sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây lạc (nhất là số lượng hoa lạc). Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung (có thể tháo nước ngập 2/3 rãnh ruộng để tưới ngấm đều rồi tháo cạn) trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng nhu cầu cần thiết của cây. Thời tiết ấm lên kéo theo nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc: sâu xám, sâu khoang...
Cây sắn		Cây con – phát triển thân lá	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 25.7°C, nền nhiệt độ trong tuần rất thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Lượng mưa trong tuần này rất thấp (6.4mm). Mặc dù sắn là loại cây có khả năng chịu hạn tốt, tuy nhiên, để bảo đảm cho cây sắn sinh trưởng tốt nhất, người dân nên tưới thêm nước bổ sung cho cây. Bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục là đối tượng gây hại chủ đạo trên cây sắn trong tuần.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Thời tiết tuần này của khu vực hầu như không có mưa rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín và công tác dọn dẹp vệ sinh vườn cây sau thu hoạch. Lưu ý, sau dọn dẹp, vệ sinh lại vườn cây, cần chú ý tưới nước

			kết hợp bón phân bổ sung để giúp cây ăn quả có múi nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân/cành, rệp, bệnh muội đen, sâu vẽ bùa...
Cây cao su		Chăm sóc-thay lá	Tuần 2 tháng 3, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 21.6-29.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 6.4mm. Trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa, nắng suất mủ cao su khai thác được bị giảm sút. Do đó, cần chú ý bổ sung thêm nước cho cây. Bệnh loét sọc miệng cao, bệnh xì mủ, bệnh nấm hồng... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cao su trong tuần.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.0 – 34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.5-28.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa không đáng kể. Một số lưu ý đối với các cây trồng trong thời gian tới như sau. Đối với cây lúa: bón phân thúc đồng đúng thời điểm, cân đối, điều tiết nước hợp lý để cây lúa phát triển tốt; chú ý theo dõi bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, chuột... để có biện pháp quản lý và xử lý kịp thời. Đối với cây ngô, lạc: bệnh cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại (bệnh héo rũ, gỉ sắt, đốm lá...), cần chú ý làm cỏ, xới xáo, tưới nước kết hợp bón phân cân đối và kịp thời để giúp cây lạc sinh trưởng tốt. Tăng cường chăm sóc, bón phân để giúp cây sản sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi và cây cao su để kịp thời phòng trừ. Bên cạnh đó, cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trong điều kiện thời tiết mưa không đáng kể.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng