



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 4 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 20.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 62.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.4^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 30.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 17.5\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 52.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Bắc đêm 21 ngày 22/4 có mưa rải rác. Ngày 24/4 có nắng nóng cục bộ, ngày 25-26/4 có nắng nóng diện rộng. (Nguồn: Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.2	18.1	21.7	31.9
Trong tuần	25.8	20.7	23.3	62.8
Tuần tới	33.0-35.0	20.0-23.0	26.5-29.0	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Đứng cái - làm đòng	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $20.7 - 25.8^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $23.3^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 62.8mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25 - 32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ phù hợp cho lúa phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây ăn quả		Quả non	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng $33.0-35.0^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, có thể lượng mưa dự báo tuần kế tiếp tương đối thấp do đó cần chủ động tưới đủ nước cho cây trồng đòng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			lan trên diện tích rộng.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bắp	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22 - 25 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 62.8mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa trong tuần phù hợp cho ngô phát triển bắp; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn cho phép.
Cây nhãn		Hoa - quả non	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 20.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 62.8mm, nhiệt độ thích hợp cho nhãn ra hoa là 25 - 31 độ C, trong thời kỳ nhãn nở hoa nếu gặp mưa thì hoa bị rụng và tỷ lệ đậu quả kém, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần không phù hợp cho nhãn phát triển giai đoạn này, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc định kỳ để làm sạch lá.
Cây chè		Chăm sóc - phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.7 - 25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 62.8mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát và ưa ánh sáng tán xạ, giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 4 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; ngay khi phát hiện sâu bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè nhiễm bệnh.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ tối cao trong khoảng 33.0-35.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ cao trong khi lượng mưa thấp, người dân cần chủ động bổ sung đủ nước cho rau màu đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp và hiệu quả.
Cây lạc	Xuân	Đâm tía - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.7 -

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
xuân			25.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 62.8mm, lạc là cây có khả năng chịu hạn tốt, nhưng vào các thời kỳ xung yếu (6 - 7 lá và phát triển củ) vẫn cần tưới nước để tăng năng suất. Khi tưới cần bơm nước ngập 2/3 rãnh chờ nước thấm đều mặt luống rồi rút kiệt đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.5-29.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa dự báo giảm mạnh người dân bên cạnh chủ động thăm đồng ruộng phát hiện và diệt trừ sâu bệnh hiệu quả thì cần đảm bảo tưới đủ nước cho cây trồng, với những ngày nắng nóng cần tưới 2 buổi/ngày, chú ý tưới rải đều không tưới sũng nước đặc biệt với diện tích cây trồng đang giai đoạn ra hoa - quả non.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**