



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 4 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 18.6 - 25.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 60.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 10.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 42.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 19.4\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 38.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 24-26/4 khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Khoảng cuối tháng 4 khả năng xuất hiện mưa rào và dông. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.1	14.4	18.7	17.9
Trong tuần	25.9	18.6	22.2	60.6
Tuần tới	35.0-37.0	18.0-21.0	26.5-29.0	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Đẻ nhánh rõ - đứng cái - làm đồng - trỗ - phơi màu	Tuần 2 tháng 4, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 3.5°C , tuần trước nhiệt độ không khí trung bình đạt 18.7°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 60.6mm, tăng 42.7mm). Thời tiết ấm hơn, cây lúa sinh trưởng tốt hơn. Trong tuần, mặc dù lượng mưa tăng đáng kể so với tuần trước, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của cây lúa trong các giai đoạn này. Để bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng tốt nhất, người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lúa; ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép, người dân cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5cm. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá/cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt...người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng kịp thời để tránh sâu bệnh phát

			sinh gây hại trên diện rộng.
Cây ngô		Xoáy nõn - trở cò - phát triển bấp	Trong tuần này, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực đạt 22.2°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 60.6mm. Lượng mưa trong tuần ở mức trung bình cơ bản phù hợp cho các diện tích ngô đang trong giai đoạn trở cò - thụ phấn thuận lợi. Tuy nhiên, lượng mưa trên của khu vực không bảo đảm được nhu cầu về nước của cây ngô. Trong các giai đoạn này, cây ngô rất cần nước, việc thiếu nước trong thời kỳ này sẽ khiến cho cây ngô sinh trưởng kém và sụt giảm năng suất khô khi thu hoạch. Do đó, trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu ăn lá, sâu đục thân, rệp hại cò, sâu đục bắp... để kịp thời phòng trừ.
Cây lạc	Xuân 2022	Ra hoa – đâm tia – phát triển củ	Cây lạc trong khu vực Tây Bắc hiện đang trong các giai đoạn ra hoa – đâm tia – phát triển củ. So với tuần trước, thời tiết của khu vực trong tuần này tốt hơn, cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lạc khiến cho cây lạc sinh trưởng tốt hơn. Thời tiết tốt hơn cũng kéo theo các loại sâu bệnh phát sinh gây hại gia tăng trên cây lạc: bệnh gỉ sắt, bệnh lở cổ rễ, sâu ăn lá các loại... Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh để kịp thời có các biện pháp phòng trừ. Ngoài ra, chú ý làm cỏ, xới xáo, vun gốc để giúp cây lạc sinh trưởng tốt hơn.
Cây rau các loại		Phát triển thân lá – thu hoạch	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây rau các loại. Lượng mưa trong tuần này của khu vực mặc dù có tăng đáng kể so với tuần trước, tuy nhiên vẫn không bảo đảm nhu cầu của các loại rau. Do đó, người dân cần tiếp tục tưới thêm nước bổ sung (lưu ý khi tưới cần tưới lúc sáng sớm hoặc chiều tối). Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây rau các loại trong tuần: sâu xanh, sâu tơ, nhện gié...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả non	Tuần 2 tháng 4, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc dao động trong khoảng 18.6-25.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 60.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần cơ bản phù hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng, tuy nhiên, lượng mưa trong tuần ở mức trung bình không đủ đáp ứng nhu cầu của cây ăn quả

			có múi. Trong giai đoạn quả non, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây. Ngoài ra, chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại: sâu đục thân, sâu vẽ bùa... đồng thời cần chú ý tỉa bỏ bớt những quả sâu bệnh, quả kém sức sống, giữ lại những quả to khỏe để giảm bớt áp lực cho cây.
Cây nhãn		Hoa - quả non	Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc hiện đang trong các giai đoạn hoa cuối vụ - quả non. Trong tuần này, lượng mưa của khu vực đạt 60.6mm, cơ bản phù hợp cho việc ra hoa - đậu quả thuận lợi. Tuy nhiên, lượng mưa trên không đủ đáp ứng nhu cầu của cây nhãn nên người dân vẫn cần tưới bổ sung. Bộ xít nâu, sâu đục nụ hoa, bệnh sương mai... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn trong tuần cần được chú ý.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè tiếp trong tuần cần chú ý: bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ, sâu đục thân...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.0-37.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.5-29.0°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng không đáng kể. Các loại cây trồng trong thời gian tới cần được chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân, làm cỏ, xới xáo để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh, tạo tiền đề cho năng suất cao; tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng