



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 19.6 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 116.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 52.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 35.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 183.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 33.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ 25/5-01/6, có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng ngày 25/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 28/5 cục bộ có nơi nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.3	19.0	22.6	64.2
Trong tuần	26.0	19.6	22.8	116.9
Tuần tới	31.0-34.0	20.0-23.0	25.5-28.5	200.0-400.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Trỗ - ngâm sữa - chắc xanh – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo của các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng $19.6-26.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 116.9mm khá phù hợp với sinh trưởng của cây lúa, tuy nhiên với các diện tích lúa đang trong giai đoạn trỗ bông thì khi gặp mưa to sẽ dẫn tới hạt phấn bị trôi gây ảnh hưởng đến năng suất lúa khi thu hoạch. Có thể nhận thấy, nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp cho cây lúa sinh trưởng. Trong tuần, một số diện tích lúa trà sớm đã bước vào giai đoạn thu hoạch, người dân cần chú ý tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để thu hoạch các diện tích lúa đã chín để tránh bị ảnh hưởng do mưa. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: rầy, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, bệnh bạc lá, bệnh khô

			vấn... người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ, đặc biệt là các trà lúa muộn hiện đang trong giai đoạn trổ - chắc xanh.
Cây ngô		Trổ cờ - phát triển bắp – thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 22.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 116.9mm. Mưa to khiến cho các diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ bị ảnh hưởng. Tương tự như đối với cây lúa, trong tuần này, một số diện tích ngô đã bước vào giai đoạn thu hoạch, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết không mưa để thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Với các diện tích ngô còn lại, cần chú ý theo dõi các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp cờ... để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
Cây lạc	Xuân 2022	Củ non - chắc củ	Tuần 2 tháng 5, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (với mức biến động của nhiệt độ không khí trung bình 0.2°C), lượng mưa trong tuần này tăng đáng kể so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 116.9mm, tăng 52.7mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy, lượng mưa của khu vực trong tuần không quá cao, tuy nhiên cần chú ý ở những khu vực trũng thấp có khả năng úng nước. Trong giai đoạn này, nếu bị úng nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của củ lạc khi thu hoạch. Sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần tiếp tục là các đối tượng sâu ăn lá, bệnh rỉ sắt, bệnh đốm lá...
Cây rau các loại		Phát triển thân lá – thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 22.8°C không thực sự thuận lợi cho cây rau các loại phát triển; lượng mưa của khu vực trong tuần này của khu vực đạt 116.9mm khá phù hợp cho cây rau các loại sinh trưởng và phát triển. Trong tuần này, cây rau các loại tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây rau các loại: sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, nhện...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 19.6-26.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 116.9mm. Lượng mưa trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, tuy nhiên nhiệt độ trong tuần của khu vực

			ở mức trung bình chưa thực sự thuận lợi cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong tuần này, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi một số đối tượng: sâu đục thân, sâu đục quả, nhện...
Cây nhãn		Phát triển quả	Tuần 2 tháng 5, cây nhãn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước. Trong điều kiện nhiệt độ như trên, cây nhãn sinh trưởng kém hơn. Lượng mưa trong tuần này của khu vực này cơ bản thuận lợi cho cây nhãn phát triển. Trong tuần này, người dân cần tiếp tục lưu ý chăm sóc bón phân và điều tiết nước hợp lý để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh và hạn chế sự rụng quả. Bọ xít nâu, sâu đục quả tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn trong tuần.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 19.6-26.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 116.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Trong tuần, cây chè chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục thân, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh ...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.5-28.5°C, tổng lượng mưa là 200.0-400.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa tăng mạnh. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để thu hoạch tối đa các diện tích cây trồng đã cho thu hoạch, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp lại đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ tiếp theo; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời có các biện pháp tiêu thoát nước cho cây trồng (nhất là các cây trồng vụ Hè thu mới xuống giống) đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên cây trồng và kịp thời các biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng