



Hà Nội, ngày 4 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM BỘ Tuần 3 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Nam Bộ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 28.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 31.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 11.7\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG): từ ngày 1/7-10/7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 31 | 26.1 | 28.5 | 81.9 |
| Trong tuần | 30.9 | 25.7 | 28.3 | 110.6 |
| Tuần tới | 31-34 | 23-26 | 27-30 | 80-150 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

| Cây trồng | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|---------------------------|---|---|
| Lúa (Hè thu 2022) | Mạ, đẻ nhánh, đòng – trổ, chín, thu hoạch | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ $25.7 - 30.9^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C , tổng lượng mưa là 110.6mm. Trong giai đoạn đẻ nhánh cần phải giữ mực nước ở mặt ruộng khoảng 1-3cm. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng $27.0-30.0^{\circ}\text{C}$ và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm. Giai đoạn này của lúa cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính là: bệnh đạo ôn lá, rầy hại lúa, sâu cuốn là nhỏ, chuột hại. |
| Lúa (Thu Đông – Mùa 2022) | Mạ, đẻ nhánh | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ $25.7 - 30.9^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C , tổng lượng mưa là 110.6mm. Toàn vùng đã xuống giống được 83.128 ha, chủ yếu giai đoạn mạ – đẻ nhánh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng $27.0-30.0^{\circ}\text{C}$ và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm. Giai đoạn này của lúa cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính là: |

| Cây trồng | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | ốc brou vàng, chuột hại. |
| Nhãn | Chăm sóc, thu hoạch | <p>Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Cây nhãn trong giai đoạn chăm sóc cần nhiều ánh sáng, thoáng, điều kiện khí tượng tuần này và tuần tới thích hợp cho nhãn phát triển quả. Cần lưu ý bao quả để tránh các bệnh bọ xít nâu và sâu đục quả tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh Đông Nam Bộ.</p> |
| Cây xoài | Ra hoa, nuôi quả, thu hoạch | <p>Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Cây xoài đang trong giai đoạn nuôi quả, bón phân cần được bón sâu để tránh bốc hơi. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm. Trong giai đoạn này của cây xoài cần lưu ý: các loại kiến, bọ xít, bệnh thán thư, phấn trắng, xỉ mù thân gây hại cho Xoài ở các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, ...</p> |
| Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi) | Đang trong nhiều giai đoạn | <p>Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Các cây trồng thành đang trong thời kỳ ra hoa kết trái, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, điều kiện khí tượng tuần tới tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành, bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, diệt cỏ dại, dùng thuốc trừ sâu bệnh tại nhiều vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.</p> |
| Sầu riêng | Nuôi quả, thu hoạch | <p>Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Lưu ý một số sâu bệnh hại thường xuất hiện trên cây sầu riêng: Rầy phấn; nhện đỏ,</p> |

| Cây trồng | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|--|--|
| | | rầy lửa; sâu đục thân, đục cành; các bệnh do nấm <i>Phytophthora palmivora</i> gây nên; thối vỏ chày nhựa tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước. |
| Điều | Chăm sóc sau thu hoạch | Tuần này với nhiệt độ không khí và lượng mưa tương đối thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Cần lưu ý đề phòng bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, sâu đục rệp lá,... tiếp tục gây hại tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương. |
| Sắn | Phát triển thân lá, phát triển củ, thu hoạch | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu: bệnh thối củ, bệnh khảm lá do virus tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. |
| Cây rau màu | Các giai đoạn khác nhau | Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, các loại rau màu khu vực Nam Bộ thích hợp với nhiệt độ; lưu ý các loại sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển. |
| Cây ngô | Cây con, phát triển thân lá, trỗ cờ, thu hoạch | Trong giai đoạn cây con, phát triển thân lá lượng nước cần ổn định để cây phát triển, cần đề phòng bệnh khô vằn, sâu keo. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. |
| Cây chôm chôm | Thu hoạch | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Điều kiện khí tượng tuần qua tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa |

| Cây trồng | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|---|--|
| | | dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn này của cây chôm chôm cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, rệp sáp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ... |
| Mía | Cây con, vươn lóng | Điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Đề phòng bệnh sâu đục thân, bông lá và làm cỏ. |
| Cây cao su | Khai thác mủ | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Cây cao su trong giai đoạn này cần phải cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để tăng sản lượng mủ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Đề phòng một số bệnh chính trên cây cao su là: bệnh phấn trắng, bệnh nấm hồng ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ... |
| Mít | Phát triển thân lá, nuôi quả, thu hoạch | Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.7 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 110.6mm. Cây mít trong giai đoạn nuôi quả cần bón phân để cây phát triển quả. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn này của cây mít cần lưu ý các loại sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, sâu đục trái, rệp sáp ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang. |
| Hồ tiêu | Chăm sóc sau thu hoạch | Trong giai đoạn này cần thường xuyên theo dõi sâu bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời cắt bỏ các bộ phận cây bị bệnh, lưu ý đề phòng các loại bệnh héo chết nhanh, bệnh vàng lá thối rễ tơ, rệp sáp cành, gốc, tuyến trùng rễ tiếp tục gây hại hồ tiêu tại các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Bình Dương và |

| Cây trồng | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|------------------------------|---|
| | | Đông Nam Bộ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. |
| Cây cà phê | Nuôi quả | Điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn này của cây cà phê cần lưu ý bệnh khô cành, gỉ sắt và bọ xít muỗi ở tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. |
| Dừa | Đang trong các giai đoạn | Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần tưới nước bón phân để cây phát triển ổn định. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm. Đề phòng bọ cánh cứng, bọ dừa, kiến vương, bọ xít và làm cỏ tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh. |
| Cây thanh long | Nuôi quả - thu hoạch | Trong giai đoạn này của cây thanh long cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, ruồi vàng hoặc hiện tượng nứt vỏ trái ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80-150mm, nhiệt độ tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động từ 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa của khu vực dao động 80-150mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ cao, cần có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả. Một số lưu ý về thời tiết trong tuần tới từ đêm 1/7-10/7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thanh Tú

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng