



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 25.3 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 79.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 37.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 26.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 34.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/7, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 02-03/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 04 -11/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.3	25.5	29.9	42.6
Trong tuần	34.1	25.3	29.7	79.7
Tuần tới	35.0-38.0	25.0-28.0	30.0-33.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu 2022	Gieo mạ - cây - đẻ nhánh - đồng trỗ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (với mức chênh lệch 0.2° C), lượng mưa của khu vực trong tuần này tăng nhẹ so với tuần trước (tuần này lượng mưa đạt 79.7mm, tăng 37.1mm). Điều kiện thời tiết nắng nóng, ít mưa là điều kiện không thuận lợi đối với sinh trưởng của cây lúa. Trong điều kiện thời tiết nói trên, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để bổ sung cho lúa vừa giúp bảo đảm nhu cầu về nước cho sinh trưởng của lúa vừa giúp làm mát cho lúa trong điều kiện nắng nóng (lên tới $>34^{\circ}$ C). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh trên cây lúa trong tuần cần chú ý: ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy

			các loại... người dân cần theo dõi chặt chẽ biến biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ.
Cây ngô	Hè thu	Cây con – phát triển thân lá - trổ cờ	Tuần 3 tháng 6, cây ngô trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong các giai đoạn cây con – trổ cờ. Thời tiết của khu vực trong tuần này tiếp tục nắng nóng gay gắt kết hợp với mưa khá thấp. Đây là điều kiện không thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây ngô trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô (khi tưới lưu ý nên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát), ngoài ra chú ý bón phân, lên luống vun gốc cho cây ngô. Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá, rệp hại cờ... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần.
Cây lạc	Hè thu	Cây con – phát triển thân lá – ra hoa	Tương tự như đối với cây lúa và cây ngô, cây lạc trong khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này sinh trưởng kém hơn do điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi. Bên cạnh công tác chăm sóc, bón phân và phòng trừ các loại sâu bệnh hại, trong các giai đoạn này, người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung thêm cho cây lạc.
Cây mía		Đẻ nhánh – vươn lóng	Trong tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 29.7°C, điều kiện nhiệt độ khá thuận lợi đối với sinh trưởng của cây mía. Lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 79.7mm, trong giai đoạn vươn lóng, cây mía cần khá nhiều nước với độ ẩm đất yêu cầu từ 75.0-85.0%. Với lượng mưa trong tuần như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây mía. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng gây hại trên cây mía: sâu đục thân, bọ phấn trắng, rệp sáp...
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Phát triển thân lá - tạo củ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 25.3-34.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 79.7mm. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa không nhiều, người dân cần chú ý tưới
	Hè thu	Xuống giống	

	2022	– cây con	thêm nước bổ sung cho cây sản để giúp cây sản sinh trưởng khỏe mạnh. Trong tuần, cây sản chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá virus, bọ phấn trắng...
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước, lượng mưa của khu vực trong tuần này tăng nhẹ tuy nhiên vẫn không đủ đáp ứng đủ nhu cầu của cây ăn quả có múi. Để bảo đảm cho cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt hơn trong điều kiện thời tiết như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: rệp, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm, sâu đục thân... để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Cây cao su		Khai thác mủ	Cây cao su trong khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Trong tuần này, việc khai thác mủ trên cây cao su tiếp tục bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết nắng nóng và lượng mưa không đủ đáp ứng nhu cầu của cây cao su khiến cho tốc độ chảy mủ cũng như lượng mủ khai thác được trên cây cao su bị sụt giảm. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý bổ sung thêm nước cho cây cao su. Bên cạnh đó tiếp tục chú ý các đối tượng: bệnh loét sọc miệng cao, bệnh xì mủ... phát sinh gây hại.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.0-38.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0-33.0°C, tổng lượng mưa là 30.0-60.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có nền nhiệt độ cao, lượng mưa không đáng kể. Các cây trồng trong thời gian tới cần được chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; có các biện pháp che chắn, làm mát cho cây trồng trong điều kiện nắng nóng gay gắt; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng

